

可彎曲陰莖假體

病人須知 · 一種可彎曲（半硬式）假體，用於治療勃起功能障礙

WARWIKI

可彎曲陰莖假體（又稱半硬式假體）係將兩條堅韌、可彎曲嘅矽膠棒植入陰莖，適合勃起功能障礙 (ED) 用藥、注射或其他療法無效嘅男性。唔需要唧泵：只要將陰莖向上彎就可以進行性行為，向下彎就可以遮蓋。呢份資料解釋佢點樣運作、點樣準備，同你要預期啲咩。

關於呢個手術

當**勃起功能障礙 (ED)** 用藥、真空裝置或注射都冇效，假體係最可靠嘅下一步。可彎曲假體係最簡單嘅一種——兩條有軟性外層、可彎曲嘅矽膠棒植入陰莖。佢時刻保持足夠硬度進行性行為，你用手擺好位置：

- **向上彎**：進行性行為
- **向下彎**：藏於衣物之下

因為冇唧泵、水囊或液體，佢係**最簡單易用、最耐用**嘅假體類型——如果操作唧泵有困難（例如手部力量不足）係個好選擇。

須知事項

同所有陰莖假體一樣，呢係一個**永久性選擇**：植入後會改變勃起組織，天然勃起及其他 ED 療法（藥物、注射）將不再有效。但佢**唔會影響你排尿、感覺、高潮或射精**。同充氣式假體相比，主要取捨係：陰莖時刻保持硬度，遮蓋稍難，感覺亦較天然勃起唔同——但更簡單耐用。

詞彙解釋

勃起功能障礙 (ED)

無法獲得或維持足夠硬度進行性行為。

陰莖假體

植入陰莖嘅裝置，當其他療法無效時令勃起成為可能。

可彎曲／半硬式

令陰莖保持硬度嘅可彎曲假體；用手調整位置，冇唧泵。

充氣式假體

另一主要類型——用唧泵充氣及放氣；較自然，但零件較多。

遮蓋

將陰莖向下彎，令假體藏於衣物之下唔被察覺。

全身麻醉

令你喺手術期間完全入睡、無痛嘅藥物。

耐用

長久耐用——冇液體零件，故障率低。

會唔會痛？ 手術係全身麻醉或脊椎麻醉下進行，過程中唔會有感覺。術後陰莖同陰囊會有痠痛、腫脹同瘀青，持續一兩個星期——用陰囊托、冰敷同止痛藥有幫助。手術時間短（通常不足一小時），多數當日完成。未獲外科醫生批准前，唔好用假體進行性行為。

點樣準備（手術前）

- 手術採用**全身麻醉或脊椎麻醉**——遵從所有手術指示（禁食、暫停服用邊啲藥，包括薄血藥）。
- **感染預防對假體手術至關重要**：任何感染（包括尿道感染）必須先行治療；你需要用消毒皂沖涼，並接受抗生素治療。
- **唔好吸煙或使用電子煙**；如果你有**糖尿病**，醫療團隊會要求你控制好血糖——兩者都能降低感染風險。

請提前告知醫療團隊，如果你：

- 有**糖尿病**或任何影響傷口癒合嘅情況
- 曾接受盆腔或陰莖手術、放射治療，或以前植入過假體

手術過程

- 1 你會在麻醉下入睡或腰部以下失去感覺，並注射抗生素。
- 2 外科醫生透過一個小切口，將**可彎曲矽膠棒**分別植入陰莖兩條海綿體。有唧泵或水囊。
- 3 縫合切口，陰莖向下擺放。術後可能短暫留置尿管。

術後護理

- 陰莖同陰囊會有**腫脹同瘀青**，持續 1-2 星期。戴上陰囊托、冰敷、服止痛藥，並保持切口清潔乾燥。
- **未獲外科醫生批准前唔好用假體進行性行為**——通常約 **4-6 星期**，待傷口完全癒合。
- 痊癒後，**唔需要學操作唧泵**——只需向上彎使用、向下彎遮蓋。醫療團隊會示範。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷，或切口位置愈來愈紅、痛、腫或有分泌物
- 唔能夠小便
- 痛楚嚴重或加劇，或陰莖顏色變暗或發紫

要記住嘅三件事

1. 可彎曲假體係兩條植入陰莖嘅矽膠棒——向上彎進行性行為，向下彎遮蓋。有唧泵，係最簡單、最耐用嘅類型。
2. 呢係一個**永久性選擇**（術後天然勃起及藥物／注射無效），但唔影響排尿、感覺、高潮或射精。
3. 預防感染最重要：先治任何感染、唔好吸煙、控制糖尿病、用消毒皂沖涼並服抗生素。獲醫生批准前（約 4-6 星期）唔好進行性行為。