

Optilume 係一個微創程序，用嚟治療尿道狹窄 (stricture) — 即係負責將尿液排出體外嗰條管道收窄咗。一個特製氣球會輕輕撐開收窄嘅位置，同時將藥物釋放入管壁，幫助防止疤痕再次形成。全程毋須切開，亦唔需要喺體外開刀。

關於呢個程序

尿道狹窄係尿道入面嘅疤痕收窄咗，令尿流變細變慢。單純擴張或切開往往會再次收窄。Optilume 同時做兩件事：

- **氣球撐開**疤痕收窄嘅位置。
- 氣球上嘅**藥物（紫杉醇 paclitaxel）**滲入管壁組織，減慢疤痕重新形成。

呢個方法適合部分**反覆復發嘅狹窄**，位置喺球部尿道（陰囊底下），且長度**短於約 3 cm**、曾經做過擴張或切開之後再復發嘅患者。效果比單純擴張更持久，但**唔等同尿道成形術**（開放式修復），後者係最耐用嘅選擇。你嘅外科醫生會同你解釋呢個方法係咪適合你。

安唔安全？

Optilume 係微創程序，經尿道進行，通常當日可以出院。整體而言耐受性良好。藥物劑量細且留喺局部。風險包括尿或精液帶血、短暫灼熱感、尿道感染 (UTI)，以及狹窄有機會隨時間再復發。

詞彙解釋

尿道

將尿液由身體排出去嗰條管道。

狹窄 (Stricture)

尿道入面嘅疤痕令管道收窄，令尿流變細。

球部尿道

尿道位於陰囊底下嗰段，係呢個治療效果最好嘅位置。

藥物塗層氣球

撐開收窄同時將藥物送入管壁嘅氣球。

紫杉醇 (Paclitaxel)

氣球上嘅藥物，幫助防止疤痕再形成。

擴張 (Dilation)

撐開收窄位置 — 喺呢度係用氣球來做。

膀胱鏡 (Cystoscope)

用嚟找到同檢查狹窄位置嘅幼型攝像鏡。

尿管 (Catheter)

程序後短暫放入尿道嘅軟管。

會唔會痛？ 程序係麻醉或鎮靜下進行，過程中你唔會有感覺。之後可能會有輕微灼熱感、盆腔或陰莖隱痛，以及短暫尿或精液帶血。通常會短暫放置尿管。程序時間短，大多可以當日出院。

點樣準備（程序之前）

- 跟從**麻醉或鎮靜指示**（禁食，以及需要暫停哪些藥物，包括薄血藥）。
- **驗尿**排除感染—如有感染須先治療。
- **安排人接送**，並預備程序後短暫帶住尿管。

提前告知你嘅醫療團隊，如果你：

- 有服用**薄血藥**，或者而家有尿道感染
- **計劃生育**—因為藥物關係，醫療團隊會要求你喺指定時間內使用安全套，並避免嘗試懷孕

程序過程中會發生咩事

- 1 你會喺**麻醉或鎮靜**下，由膀胱鏡確認狹窄嘅長度同位置。
- 2 一條幼導絲穿過狹窄位置，並先做小量預擴張以容納氣球。
- 3 藥物塗層氣球對準疤痕位置，充氣一段時間，將藥物送入組織。
- 4 氣球同鏡取出後，放入尿管短暫留置。

之後

- 尿管會喺**短時間後取出**；你嘅醫療團隊會告知確實時間。
- 預計會有**輕微灼熱感**，以及數日尿或精液略帶**粉紅色**。多飲水有幫助。
- 短期內**避免劇烈活動**，並按醫囑覆診做尿流或症狀評估。
- 按醫療團隊指示嘅時間內**使用安全套**，原因係藥物關係。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏寒
- **完全排唔到尿**，尤其係取走尿管之後
- 大量出血，或尿液有血塊
- 痛楚愈來愈嚴重而非減輕

要記住嘅三件事

1. Optilume 用氣球撐開尿道狹窄，同時釋放藥物防止疤痕再形成一係內窺鏡選擇，唔係開放式尿道成形術嘅替代。
2. 準備：跟從禁食及藥物指示，先治好感染，安排接送，若計劃生育請提前告知醫療團隊。
3. 數日內輕微灼熱及尿或精液少量帶血屬正常。按指示使用安全套；如有發燒、大量出血或排唔到尿，請即求醫。