

陰莖摺疊術

病人須知 · 矯正陰莖彎曲嘅手術（佩羅尼氏病）

WARWIKI

佩羅尼氏病（Peyronie's disease）係陰莖內有疤痕組織（硬塊），令陰莖勃起時出現彎曲，有時會令性行為變得困難。陰莖摺疊術係喺陰莖較長嗰側縫幾針，令兩側長度相符，從而令陰莖挺直。呢份資料解釋手術點樣做、點樣準備，以及術後可以預期啲咩。

關於呢個手術

佩羅尼氏病嘅疤痕組織令陰莖一側收緊，勃起時就會向嗰側彎。摺疊術係喺較長（外側）嗰邊縫線，縮短佢直至兩側相符，唔需要切除疤痕，亦唔需要移植組織（graft）——係所有矯直手術入面最簡單、最短嘅一種，引致新勃起問題嘅風險最低。

以下情況適合呢個手術：

- 彎曲程度適中，唔太複雜
- 你嘅勃起功能良好（有冇用藥都可以）
- 陰莖夠長，縮短少少係可以接受嘅

要知嘅事

主要取捨係陰莖會縮短少少——通常約 1-2 厘米。好多人高估咗縮短程度；因為彎曲已矯正，實際可用嘅直立長度往往同以前相若。大約十分之九嘅男士術後勃起夠直，可以正常性行為。你可能喺皮膚下面摸到縫線（常見，通常唔會造成困擾）。目標係令陰莖夠直、性行為舒適，唔一定要完全筆直。

詞彙解釋

佩羅尼氏病

陰莖內嘅疤痕令勃起時出現彎曲。

硬塊（Plaque）

引起彎曲嘅疤痕組織。

摺疊術（Plication）

喺陰莖較長嗰側縫線，縮短佢令兩側相符，從而矯直。

人工勃起

手術室內用注射方式製造嘅勃起，讓外科醫生量度同檢查彎曲程度。

包皮環切術

切除包皮——如果你未有做過，有時會同時進行。

真空泵裝置

復元期間有時用嚟幫助保持長度同勃起功能嘅泵。

全身麻醉

手術期間令你完全入睡、感唔到痛嘅麻醉藥。

會唔會痛？ 手術係喺全身麻醉、脊椎麻醉或局部麻醉下進行，過程中你唔會有感覺。術後陰莖會腫脹、瘀青、酸痛，持續約 1-2 星期—冰敷、穿有承托力嘅內褲同服用止痛藥可以幫助。手術時間通常約一小時，大多數情況當日可以出院。術後可能短暫留有尿管。

點樣準備（手術之前）

- 手術會用**全身麻醉、脊椎麻醉或局部麻醉**—遵從所有手術指示（禁食，以及停用哪些藥物，包括薄血藥）。
- 你嘅佩羅尼氏病應該已**穩定**（彎曲同痛楚已平穩數個月）—外科醫生會確認時機是否合適。
- **唔好吸煙**；任何感染要先治療，手術前會用抗生素。如果你未有做包皮環切術，可能同時進行—請向外科醫生查詢。

請**提前告知醫療團隊**，如果你：

- 有**勃起功能障礙 (ED)** 或正在服用勃起藥物
- 服用薄血藥，或曾經做過陰莖手術

手術過程中會發生咩事

- 1 你喺麻醉下入睡或局部麻木，並會使用抗生素。
- 2 外科醫生會**注射藥物製造人工勃起**，以查看彎曲程度，然後喺較長個側縫線，摺疊矯直陰莖。
- 3 再次製造人工勃起確認效果，然後縫合皮膚（如有需要，同時進行包皮環切術）。

之後

- 預期陰莖會**腫脹、瘀青、酸痛**約 1-2 星期。冰敷、穿有承托力嘅內褲、服止痛藥，並保持傷口清潔。
- 如有留尿管，通常翌日早上就可以拔除。
- **約 4-6 星期內避免性行為**，讓傷口癒合。
- 醫療團隊可能會建議你服用**低劑量勃起藥**及／或每日使用**真空泵裝置**，幫助保持長度同勃起功能。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或發冷，或傷口出現紅腫、疼痛加劇或滲液
- 唔能夠排尿
- 嚴重或持續加重嘅腫脹、痛楚，或大量出血

要記住嘅三件事

1. 摺疊術係喺陰莖較長個側縫線嚟矯直彎曲—唔需要切除疤痕或移植組織，係風險最低嘅矯直手術。
2. 主要取捨係會縮短少少（通常 1-2 厘米），但矯正彎曲後實際可用長度往往相若；約十分之九男士勃起夠直。你可能摸到皮下縫線。
3. 手術前佩羅尼氏病要穩定、唔好吸煙。術後避免性行為約 4-6 星期，遵從復元計劃（藥物／真空泵）。如有發燒、嚴重腫脹或排尿困難，請立即求診。