

會陰部尿道造口術

病人須知 · 喺會陰部造一個永久嘅排尿開口

WARWIKI

會陰部尿道造口術係喺會陰部（陰囊同肛門之間嘅位置）造一個永久嘅排尿開口。當尿道因狹窄、疤痕或損傷而無法修復時，就會採用呢個方法。術後你會坐低，從呢個開口排尿，而唔係從陰莖尖端排尿。呢份資料解釋手術點樣做、點樣準備，同你可以預期咩。

關於呢個手術

尿道狹窄係尿道因疤痕收窄而阻礙尿流嘅情況。當狹窄範圍太長、反覆復發，或者尿道損傷太嚴重無法修復時，外科醫生會將狹窄後面**健康嘅尿道**帶到會陰皮膚，縫合造成一個持久嘅新開口，讓尿液從呢度排出。

呢係一個**可靠、持久**嘅方案，避免更長或反覆嘅重建手術 — 適合複雜狹窄，或者你唔想多次手術嘅情況。

需要知道嘅事

主要嘅改變係你會**坐低排尿**，尿液從新開口流出，唔再從陰莖尖端排出。大部分男士都適應得好，對結果滿意。你嘅**陰莖仍然喺原位** — 感覺同高潮通常唔受影響，大部分男士都能保持勃起（部分人可能有輕微變化）。開口有機會**隨時間收窄**；如果發生，通常可以用小手術再次擴開。

詞彙解釋

尿道

將尿液帶出體外嘅管道。

尿道狹窄

尿道因疤痕收窄，阻礙尿液流動。

會陰部

陰囊同肛門之間嘅位置，即新開口所在。

會陰部尿道造口術

將尿道帶到會陰部造永久開口嘅手術。

造口

尿液排出體外嘅新開口。

造口收窄

新開口隨時間變窄 — 通常可用小手術處理。

尿管

術後放置約一至兩週、讓傷口癒合用嘅軟管。

全身麻醉

令你喺手術期間睡著、唔感到痛楚嘅藥物。

會唔會痛？ 手術係全身或脊椎麻醉下進行，過程中唔會有感覺。術後會陰部會有腫脹、瘀青同酸痛，持續約 1–2 週 — 溫水坐浴、冰敷同止痛藥有幫助。手術期間會放置尿管。好多人當日或隔日就可以出院。

點樣準備（手術之前）

- 需要**全身或脊椎麻醉** — 跟從所有手術指示（禁食，以及暫停哪些藥物，包括薄血藥）。
- **驗尿**檢查有冇感染（先治療感染才手術）；你會獲處方抗生素。**唔好吸煙** — 吸煙會減慢癒合。
- 手術期間雙腳會放喺腿架上。安排好**放置尿管約 1–2 週**，以及有人接你返屋企。

提前告知醫療團隊，如果你：

- 曾接受**盆腔放射治療** — 新開口收窄嘅風險較高
- 正在服用薄血藥，或者而家有感染

手術過程

- 1 你係麻醉下入睡或局部麻木，雙腳放喺腿架上；醫護人員會給你注射抗生素。
- 2 外科醫生經會陰部切口，找到狹窄後面健康嘅尿道，移除或繞過疤痕部分。
- 3 將健康尿道帶到皮膚，縫合造成寬闊嘅新開口；放置尿管，縫合傷口。

術後注意事項

- 預期會陰部腫脹、瘀青同酸痛約 1–2 週。溫水坐浴、冰敷同止痛藥有幫助；保持患處清潔。
- **尿管留置約 1–2 週**，之後由醫療團隊取出。此後你會坐低從新開口排尿。
- 數週內**避免重物、過度用力、踩單車同性行為**，並按指示避免直接坐壓患處。
- 如果尿流隨時間減弱，可能係開口收窄 — 告知醫療團隊，小手術通常可以擴開。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 尿管脫出或停止引流，或者取出尿管後**無法排尿**
- 發燒或畏寒，或傷口愈來愈紅腫、疼痛或有分泌物
- 大量出血

要記住嘅三件事

1. 會陰部尿道造口術係會陰部造一個永久嘅排尿開口 — 適用於尿道過度狹窄或損傷無法修復嘅情況。術後你會**坐低排尿**。
2. 手術持久可靠，避免更長或反覆嘅手術。你嘅**陰莖仍然喺原位**；感覺同高潮通常唔受影響，大部分男士都能保持勃起。
3. 預期放置尿管約 1–2 週。開口有機會隨時間收窄 — 如尿流減弱請告知醫療團隊。發燒、大量出血或排尿困難請即刻求診。