

Paglalagay ng Suprapubic Catheter

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Ano ang aasahan bago ang prosedura

Ang suprapubic catheter — tinatawag ding suprapubic tube o “SPT” — ay isang malambot na tubo na nagpapalabas ng ihi mula sa pantog sa pamamagitan ng maliit na bukas sa ibabang tiyan, sa itaas ng pubic bone, sa halip na sa urethra. Inilalarawan ng handout na ito kung bakit ito inilalagay, paano maghanda, at ano ang aasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang pantog ay nag-iimbak ng ihi. Kapag hindi makalabas ang ihi sa karaniwang paraan — o kailangang pahingahin o lampasan ang urethra — maaaring ilagay ang catheter nang direkta sa pantog sa pamamagitan ng ibabang tiyan. Dahil nalalampasan ang urethra, ang suprapubic tube ay mas komportable para sa matagalang paggamit at hindi nakapipinsala sa urethra kumpara sa karaniwang catheter.

Maaaring irekomenda ng inyong care team ang suprapubic tube para:

- Palabasin ang ihi kapag hindi kayo makapaglabas nito nang mag-isa
- Pahingahin o protektahan ang urethra pagkatapos ng operasyon o pinsala
- Magbigay ng komportableng matagalang drainage (halimbawa, kapag may kondisyon ng nerve ang pantog)
- Maiwasan ang irritasyon na dulot ng pangmatagalang catheter sa urethra
- Payagan ang normal na sekswal na aktibidad, at “voiding trials” (maaaring isara ang tubo para subukan ang pag-ih)

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ito ay isang karaniwang, ligtas na prosedura. Para manatiling ligtas, pinupuno ang pantog para tumaas ito laban sa dingding ng tiyan, at karaniwang gumagamit ng ultrasound at/o maliit na camera ang inyong team para gabayan ang tubo palayo sa bituka. Karamihan sa mga isyu — kaunting pagdurugo, banayad na sakit, o bladder cramping — ay menor at mabilis na nawawala. Sabihin sa inyong team kung nagkaroon kayo ng operasyon sa tiyan o pelvis noon, dahil nangangailangan ito ng dagdag na pag-iingat.

MGA TERMINO

Suprapubic

Sa itaas ng pubic bone, sa ibabang tiyan — kung saan lumalabas ang tubo.

Pantog (Bladder)

Ang organ na nag-iimbak ng ihi hanggang sa ito ay palabasin.

Catheter

Malambot na tubo na nagpapalabas ng ihi. Ang suprapubic catheter ay lumalabas sa tiyan, hindi sa urethra.

Urethra

Ang tubo na karaniwang nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Nalalampasan ito ng suprapubic tube.

Local anesthetic

Pampaalis-sakit na inilalagay sa balat para hindi masakit ang lugar.

Sedation / Anesthesia

Gamot para marelax kayo, o matulog (general anesthesia), habang ginagawa ang prosedura.

Ultrasound / Camera

Mga kagamitan (sound-wave imaging, o maliit na camera sa pantog) para ligtas na mailagay ang tubo.

Bladder spasm

Biglaang pamimilipit ng pantog — karaniwan pagkatapos, at naaayos.

MASAKIT BA? Depende sa paraan: may sedation lamang, o **general o spinal anesthesia** — sasabihin sa inyo ng team. Normal ang kaunting pamimilit ng pantog o pananakit sa lugar pagkatapos. Tumatagal ito ng mga 15–30 minuto.

Paano Maghanda (Bago ang Prosedura)

- **Pumunta na may puno o mapunong pantog kung hiniling** — mas ligtas ang paglalagay. Maaaring painom ng tubig at papigilan ang pag-ihing, o pupunuin ang pantog sa simula ng prosedura.
- **Sundin ang mga tagubilin sa pag-aayuno** — kung magkakaroon ng sedation o general anesthesia, maaaring huwag kumain o uminom ng ilang oras bago.
- **Mag-ayos ng sasakyang pauwi** kung magse-sedate kayo.

Sabihin sa inyong team **nang maaga** kung kayo ay:

- Nagkaroon ng **operasyon sa tiyan o pelvis** — ang peklat ay maaaring magbago ng pinaka-ligtas na landas ng tubo
- Umiinom ng **blood thinner** o may problema sa pagdurugo — karaniwang ipinapahinto ito bago ang prosedura
- Posibleng **buntis**, o may impeksiyon, o may allergy sa anesthesia o latex

Ano ang Nangyayari Habang Isinasagawa ang Prosedura

- 1 Ikukumportable kayo at bibigyan ng anesthesia — pampaalis-sakit na may sedation, o general o spinal anesthesia. Lililinisin at ihahanda ang ibabang tiyan.
- 2 Pupunuin ng likido ang pantog (kung hindi pa puno) para tumaas ito laban sa dingding ng tiyan, malayo sa bituka.
- 3 Gagabayan ng ultrasound at/o maliit na camera sa pantog ang inyong team na gumawa ng maliit na hiwa sa itaas ng pubic bone at ipasok ang tubo sa pantog.
- 4 Magpapalaki ng maliit na balloon sa loob ng pantog para hawakan ang tubo, at ikokonekta ito sa drainage bag.

Pagkatapos ng Prosedura

- Lalabas ang ihi sa bag, at **ituturo ng inyong team kung paano alagaan ang tubo at balat** bago umuwi.
- Normal ang banayad na aching, bladder cramping, o **kaunting dugo sa ihi** sa loob ng isa o dalawang araw.
- Ang **unang pagpapalit ng catheter ay gagawin ng team**, mga 4–6 linggo pagkatapos. Kung mahulog ang tubo, makipag-ugnayan agad — maaaring magsara ang bukas sa ilang oras.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig
- Ang tubo ay **nahulog**, o huminto sa pag-drain (walang ihi sa bag)
- Lumalalang sakit sa tiyan, pamamaga, o matinding pagdurugo
- Maulap, mabahong ihi (tanda ng impeksiyon)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang suprapubic tube ay nagpapalabas ng ihi sa pamamagitan ng maliit na bukas sa ibabang tiyan, hindi sa urethra — mas komportable sa matagalang drainage.
2. Para maghanda: may mapunong pantog kung hiniling, sundin ang pag-aayuno, mag-ayos ng sasakyan kung mase-sedate, at sabihin ang nakaraang operasyon sa tiyan, blood thinners, o posibilidad ng pagbubuntis.
3. Ginagawa ito gamit ang sedation o general anesthesia. Ituturo ng team ang pag-aalaga ng tubo at gagawin ang unang pagpapalit sa mga 4–6 linggo.