

Testosterone Replacement Therapy (Mga Lalaki)

Impormasyon para sa Pasyente · Paggamot para sa nakumpirmang mababang testosterone na **WARWIKI** may sintomas

Ang testosterone replacement therapy (TRT) ay para sa mga lalaking may **nakumpirmang mababang antas ng testosterone** at may sintomas nito — tulad ng mababang sex drive, pagod, mababang mood, o pagbaba ng kalamnan at ereksyon. Ibinabalik nito ang testosterone sa normal na antas gamit ang gel, iniksyon (injection), patch, o implanted pellets. Hindi ito paggamot para sa "anti-aging" at hindi para sa normal na antas ng testosterone.

Paano Ito Gumagana & Para Kanino

Ang mababang testosterone (hypogonadism) ay nasusuri gamit ang **dalawang blood test sa umaga** kasama ang mga sintomas — ang isang mababang resulta lamang ay hindi sapat. Kapag pareho ang naroroon, makakatulong ang TRT na mapabuti ang enerhiya, libido, mood, at kalamnan sa loob ng ilang linggo hanggang buwan.

Mga Uri ng TRT

- **Gel o solusyon** — inilalapat araw-araw (dapat iwasang mahaplos ang balat ng kababaihan at mga bata).
- **Mga iniksyon** — bawat 1–2 linggo, o isang pangmatagalang uri bawat ~10 linggo.
- **Mga patch, implanted pellets** (bawat 3–6 buwan), o nasal gel.

MGA TERMINO

Testosterone

Ang pangunahing hormon ng lalaki; nakakaapekto sa libido, enerhiya, mood, at kalamnan.

Hypogonadism

Nakumpirmang mababang testosterone.

Hematocrit

Blood test na maaaring taasan ng TRT — ito ay sinusubaybayan (monitored).

PSA

Blood test para sa prostate; sinusuri bago at habang ginagamot.

Pertilidad (Fertility)

Binababa ng TRT ang produksyon ng sperm — mahalaga kung nais pa kayong magkaanak.

Gel transfer

Paglipat ng gel sa iba sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan — takpan ang lugar at hugasan ang kamay.

NAGPAPLANONG MAGKAANAK? Sabihin muna sa inyong care team. Ang TRT ay **nagpapababa ng produksyon ng sperm at maaaring magdulot ng kawalan ng kakayahang magkaanak (infertility)** — minsan pangmatagalan. Kung mahalaga sa inyo ang pertilidad (kakayahang magkaanak), may ibang paggamot na nagpapataas ng testosterone habang pinoprotektahan ang sperm. Huwag simulan ang TRT nang hindi ito tinalakay.

Pagsubaybay (Mahalaga)

Ang TRT ay nangangailangan ng regular na check-up at blood test:

- **Antas ng testosterone** — upang matiyak na nasa tamang hanay kayo.
- **Hematocrit** — maaaring pampalapain ng TRT ang dugo; kung masyadong mataas, inaayos o pansamantalang pinipigilan ang dosis.
- **PSA / prostate** — sinusuri bago at habang ginagamot; hindi sinisimula ang TRT kapag may hindi pa nagagamot na kanser sa prostate.

Ligtas na Paggamit

- **Gel:** ilapat ayon sa tagubilin, hayaang matuyo, takpan ang lugar, at hugasan ang kamay — iwasang mailipat sa kababaihan o mga bata.
- Huwag baguhin ang inyong sariling dosis; huwag palampasin ang mga laboratoryo (lab appointments).
- Ipaalam sa inyong care team ang anumang sakit sa puso o **sleep apnea** (maaaring lalong lumala ito sa TRT).

Mga Karaniwang Side Effect

- Acne, mamantika na balat, pamamaga dahil sa tubig
- Pananakit ng dibdib; pagliit ng mga itlog; pagbaba ng pertilidad
- Pagtaas ng bilang ng red blood cells (maaaring kailangang subaybayan o kumuha ng dugo)

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Pananakit ng dibdib, pamamaga/sakit ng binti, o kahirapan sa paghinga
- Matinding sakit ng ulo, pagbabago ng paningin, o sintomas ng "makapal na dugo"
- Bagong problema sa pag-ihi o alalahanin sa prostate

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang TRT ay para sa mga lalaking may **nakumpirmang mababang testosterone at sintomas** — hindi para sa normal na antas o anti-aging.
2. Ito ay **nagpapababa ng pertilidad** — ipaalam sa inyong care team bago magsimula kung baka nais pa kayong magkaanak.
3. Nangangailangan ito ng patuloy na pagsubaybay (testosterone, blood count, prostate). Sa mga gel, iwasang mailipat sa iba.