

Pagkukumpuni ng Ureter

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Operasyon para ayusin ang naharang o nanakit na ureter

Ang pagkukumpuni ng ureter ay operasyon para ayusin ang naharang o napasikit na ureter — ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato patungo sa pantog — upang maibalik ang maayos na daloy at maprotektahan ang bato. Ang paraan ng operasyon ay depende sa lokasyon at haba ng pagsikip; maaaring gamitin ang sariling dulo ng ureter, isang graft (patch ng tissue), o isang bahagi ng bituka.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang **stricture** (pagsikip dahil sa peklat) sa ureter ay pumipigil sa daloy ng ihi at maaaring makapinsala sa bato. Ang pagkukumpuni ay naka-angkop sa bawat sitwasyon:

- **Maikling pagsikip** — ang may sakit na bahagi ay tinatanggal at ang malusog na mga dulo ay tinatahi, o muling kinokonekta ang ureter sa pantog (minsan ang pantog ay itinaas para maabot ito).
- **Mas mahabang pagsikip** — ang ureter ay pinalapad gamit ang isang **graft**, kadalasan ay isang maliit na piraso mula sa loob ng pisngi (may sariling handout ito).
- **Napakahaba o malubhang pinsala** — isang bahagi ng sariling **bituka** ang ginagamit para punan o palitan ang nawasak na ureter.

Isang malambot na **stent** (tubo) ang inilalagay sa loob para manatiling bukas ang reparo habang gumagaling. Kadalasan ito ay ginagawa nang **robotic o laparoscopic** (keyhole/maliit na butas), minsan bukas. Mataas ang tagumpay.

Ligtas Ba Ito?

Ito ay mga kilala at epektibong operasyon, na iniakma sa inyong anatomy. Tulad ng anumang malaking operasyon, may ilang panganib — pagdurugo, impeksiyon, o pansamantalang pagtulo ng ihi (karaniwang natutugunan ng stent at drain). Bihira na bumalik ang pagsikip. Kung ginamit ang bahagi ng bituka, kakailanganin ng ilang araw para gumaling ang tiyan at maaaring may kaunting mucus sa ihi.

MGA TERMINO

Ureter

Ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato patungo sa pantog.

Stricture

Pagsikip dahil sa peklat na pumipigil o humaharang sa daloy ng ihi.

Ureteral stent

Malambot na tubo sa loob ("double-J") na nagpapanatiling bukas ang reparo habang gumagaling.

Graft

Maliit na patch ng sariling tissue, kadalasan mula sa loob ng pisngi, para palawakin ang ureter.

Bahagi ng bituka

Maikling piraso ng sariling bituka para punan ang mahabang puwang.

Reimplantation

Muling pagkonekta ng ureter sa pantog.

Hydronephrosis

Pamamaga ng bato dahil sa ihing naitipon sa likod ng harang.

Robotic / laparoscopic

Keyhole surgery sa pamamagitan ng ilang maliit na hiwa.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, may kaunting sakit sa mga hiwa, at ang stent sa loob ay maaaring magdulot ng biglaang pangangailangang umihi o sakit sa tagiliran. Kung ginamit ang bituka, ilang araw bago "gumising" ang tiyan. Karamihan ay nanatili nang 1–3 gabi.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Ginagawa sa ilalim ng **general anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ihihint, kasama ang blood thinners).
- Ang **pagsusuri ng ihi** ay titingnan kung may impeksiyon — kailangang gamutin muna ito.
- **Huwag manigarilyo** — nagpapabagal ito ng paggaling. Kung posibleng gumamit ng bahagi ng bituka, maaaring kailanganin ng bowel prep; kung cheek graft, alagaan ang bibig.
- Maghanda para sa **stent na nasa loob ng halos 4–6 na linggo**, at mag-ayos ng sasakyan pauwi.

Sabihin sa inyong care team nang maaga kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon
- Nagkaroon na ng operasyon sa tiyan/balakang o radiation dati

Ano ang Nangyayari Habang Nag-ooperasyon

- 1 Kayo ay natutulog sa ilalim ng anesthesia at bibigyan ng antibiotics.
- 2 Ang siruhano ay gagawa ng keyhole o bukas na hiwa at ilalantad ang nasakit na bahagi.
- 3 Ang ureter ay ikikumpuni — isasama ang mga dulo, papatchin ng graft, o puputulan ng bahagi ng bituka — sa ibabaw ng stent.
- 4 Maaaring mag-iwan ng maliit na drain, at isasara ang mga hiwa.

Pagkatapos ng Operasyon

- Karaniwang uuwi kayo pagkatapos ng **1–3 araw**.
- Ang **stent ay nananatili sa loob ng halos 4–6 na linggo**, pagkatapos ay tinatangal sa opisina sa pamamagitan ng mabilis na cystoscopy.
- Mga sintomas ng stent — biglaang pangangailangang umihi, banayad na sakit sa tagiliran, o pintig na ihi — ay **normal**.
- Kung ginamit ang bahagi ng bituka, kumain nang magaan habang gumagaling ang tiyan. **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat** ng ilang linggo.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginiging
- Matindi o lumalalang sakit sa tagiliran o tiyan
- Matinding pagdurugo, o hindi makaihi
- Patuloy na pagsusuka, o walang gas o dumi (kung ginamit ang bituka)
- Lumalaking pamumula, sakit, o pagtatago sa hiwa

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Binubuksan nito ang naharang na ureter para maprotektahan ang bato. Ang reparo ay iniakma sa inyo — pagsasama ng mga dulo, cheek graft, o bahagi ng bituka — sa ibabaw ng stent.
2. Para maghanda: pag-aayuno at gamot, gamutin muna ang impeksiyon, huwag manigarilyo, stent ng 4–6 na linggo, at mag-ayos ng sasakyan.
3. Ang stent ay maaaring magdulot ng biglaang pangangailangang umihi hanggang matanggal sa opisina.