

Ang urethral bulking ay isang minimally invasive na paggamot para sa **stress urinary incontinence** — pagtagas ng ihi kapag umubo, tumatawa, o gumagalaw. Isang malambot na materyal ang ini-inject sa paligid ng urethra upang mas mahigpit itong magsara, kaya mas kaunting ihi ang lumalabas kapag may biglaang diin. Mabilis ito, walang hiwa, at maaaring maging alternatibo o unang hakbang bago mag-sling surgery.

Paano Ito Gumagana

Ang bulking material ay inilalagay sa dingding ng urethra sa ilang lugar upang ito ay **mapalapad** at mas mahigpit na magsara. Dahil dito, mas kaunting ihi ang tumatagas kapag may biglaang presyon sa tiyan.

Angkop Ba Ito sa Akin?

- Magandang pagpipilian kung gusto ninyo ng **mabilis at mababang panganib** na paggamot nang walang operasyon
- Nakakatulong para sa mga hindi angkop, o ayaw, ng sling
- Maaaring gamitin bilang **pansamantala** bago magpasya para sa operasyon

Karaniwan itong **hindi kasintagal** ng sling at maaaring hindi ganap na mawala ang pagtagas, ngunit maaaring **ulitin** kung bumaba ang epekto.

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag may diin — pag-ubo, pagtawa, pag-angat, ehersisyo.

Bulking agent

Ang malambot na materyal na ini-inject upang mapalapad ang dingding ng urethra.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Cystoscope

Ang manipis na camera na ginagamit upang gabayan ang injection.

Sling

Isang surgical na suporta sa ilalim ng urethra — mas matibay na alternatibo.

MASAKIT BA? Karaniwan itong isang **office procedure na may local na pampatigil ng sakit**, tumatagal ng mga 10–15 minuto. Karamihan ay nakakaramdam lang ng banayad na presyon at nakakauwi na sa araw ding iyon. Normal ang banayad na hapdi pagkatapos.

Paano Maghanda

- Isang **pagsusuri ng ihi** upang matiyak na walang impeksiyon bago ang procedure
- Sabihin sa inyong care team ang tungkol sa **blood thinners** at mga alerhiya
- Walang malaking paghahanda — karaniwang kaya ninyong magmaneho pauwi

Ano ang Nangyayari

- 1 Inilalapat ang pampatigil ng sakit.
- 2 Ipinasok ang manipis na **cystoscope** upang makita ang urethra.
- 3 Ini-inject ang bulking material sa ilang lugar sa paligid ng urethra.
- 4 Inalis ang scope; bago umalis, inaasahang maihi muna kayo.

Pagkatapos

- Normal ang banayad na hapdi, biglaang pangangailangang umihi, o kaunting dugo sa ihi sa loob ng isa o dalawang araw.
- Maaaring mahirapan kayong umihi nang kaunti pagkatapos — karaniwan itong mabilis lumipas.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi kayo makapagihi** pagkatapos ng procedure
- Lagnat o pangininginig (posibleng impeksiyon)
- Malakas na pagdurugo o lumalang na sakit

Mabuting Malaman

- Makikita ang buong epekto sa loob ng ilang linggo.
- Kung bumalik ang pagtagas sa paglipas ng panahon, maaaring **ulitin** ang injection.
- Ang sling ay nananatiling pagpipilian kung gusto ninyo ng mas matagal na solusyon.

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang urethral bulking ay mabilis na injection na walang hiwa na tumutulong sa urethra na magsara, na nagbabawas ng stress na pagtagas.
2. Hindi ito kasintagal ng sling at maaaring hindi ganap na mapigilan ang pagtagas, ngunit mababa ang panganib at maaaring ulitin.
3. Mabilis ang paggaling. Tumawag kung hindi kayo makapagihi o magkaroon ng lagnat pagkatapos.