

Urethral Diverticulum

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Isang supot sa urethra na kumukuha ng ihi

Ang urethral diverticulum ay isang maliit na **supot o balsa** na nabubuo sa urethra — ang tubo na naglalabas ng ihi mula sa katawan — at halos palaging nangyayari sa kababaihan. Maaaring maiipon ang kaunting ihi sa supot, na nagdudulot ng pagtagas, discomfort, paulit-ulit na impeksiyon, o sakit habang nagtatalo. Madalas itong hindi mapansin sa loob ng maraming taon, ngunit kapag nakilala na ay napakagagamot.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang mga klasikong palatandaan ay tinatawag na “**tatlong D**”:

- **Dribbling** (pagtagas) — kaunting ihi ang tumatawid pagkatapos umihi
- **Dysuria** — pagsusunog o discomfort habang umihi
- **Dyspareunia** — sakit habang nagtatalik

Kasama rin ang **paulit-ulit na impeksiyon sa ihi**, biglaang pangangailangang umihi o madalas na pag-ihing, o isang masakit na bukol sa harap na dingding ng puki (vagina) na maaaring maglabas ng likido kapag pinindot.

Mga Sanhi

Nagsisimula ito kapag ang maliliit na glandula sa paligid ng urethra ay **nabara at na-infect**, pagkatapos ay sumabog papunta sa urethra, na nag-iiwan ng supot na napupuno ng ihi. Hindi ito kanser at hindi ito sanhi ng anumang ginawa ninyo.

MGA TERMINO

Urethra

Ang tubo na naglalabas ng ihi mula sa katawan.

Diverticulum

Isang supot na lumalabas sa isang tubo — ang urethral diverticulum.

Ang “3 D”

Dribbling (pagtagas), dysuria (pagsusunog), at dyspareunia (sakit sa pakikipagtalos).

MRI

Ang pinakamabuting scan upang makita ang laki at hugis ng supot bago ang operasyon.

Diverticulectomy

Operasyon na pagtatanggal ng supot at pagkukumpuni ng urethra.

Martius flap

Maliit na tissue flap na ginagamit minsan upang palakasin ang repair.

Cystoscopy

Pagtingin sa loob ng urethra at pantog gamit ang manipis na camera.

KAILANGAN KO BA NG OPERASYON? Hindi palagi. Ang maliit na supot na walang sintomas ay maaaring bantayan lamang. Ngunit kapag nagdudulot ito ng pagtagas, paulit-ulit na impeksiyon, sakit, o nakakaabala na bukol, ang pagtatanggal nito (diverticulectomy) ang pinakatiyak na lunas. Mag-iimapa muna ng maingat ang inyong siruhano gamit ang MRI.

Paano Ito Nasusuri

- Pisikal na pagsusuri — masakit na bukol sa harap na dingding ng puki na maaaring maglabas ng likido
- **MRI**, ang pinakamabuting paraan upang makita ang laki at hugis ng supot
- Minsan ay **cystoscopy** upang makita ang bukana mula sa loob

Paano Ito Ginagamot

- 1 **Pagmamasid** para sa maliit na supot na walang sintomas.
- 2 **Gamutin ang impeksiyon** muna kung mayroon.
- 3 **Diverticulectomy** — operasyon sa pamamagitan ng puki upang alisin ang supot at maingat na ayusin ang urethra sa mga patong, minsan may maliit na tissue flap.
- 4 Itinatago ang **catheter** habang gumagaling, at karaniwang ginagawa ang isang **X-ray ng kagalingan** bago alisin ito.

Mabuting Malaman

- Ang repair ay delikado — asahan ang catheter sa loob ng ilang linggo pagkatapos.
- Karamihan ay nakakakuha ng magandang ginhawa; paminsan-minsan ay maaaring bumalik ang supot o lumabas ang bagong pagtagas, na maaaring ayusin.
- Karaniwang pinaplano ang operasyon kapag wala nang aktibong impeksiyon.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat, panginginig, o lumalalang sakit sa pelvis
- **Hindi kayo makaihi**, o huminto ang pagdaloy ng catheter (pagkatapos ng operasyon)
- Malakas na pagdurugo, o bagong tuluy-tuloy na pagtagas ng ihi

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang urethral diverticulum ay isang supot sa urethra — isipin ang “3 D” (pagtagas, pagsusunog, sakit sa pakikipagtalos) at paulit-ulit na impeksiyon.
2. Ang MRI ang pinakamabuting paraan upang makita ito. Ang maliliit na supot na walang sintomas ay maaaring bantayan; ang mga nakakaabala ay tinatanggal sa pamamagitan ng maingat na repair.
3. Asahan ang catheter at X-ray ng kagalingan pagkatapos ng operasyon. Tumawag para sa lagnat, kawalan ng kakayahang umihi, o bagong tuluy-tuloy na pagtagas.