

Urethroplasty (Pagkukumpuni ng Urethra)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Operasyon para ayusin ang pagsikip ng urethra

Ang urethroplasty ay operasyon para ayusin ang pagsikip ng urethra — ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Ang pagsikip (stricture) ay nagpapabagal o naghahadlang sa daloy ng ihi; binubuksan ito ng urethroplasty at ito ang pinakamatibay na solusyon. Ipinapaliwanag ng handout na ito kung paano ito ginagawa, paano maghanda, at ano ang asahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Ang **stricture** (pagsikip ng urethra) ay peklat sa loob ng urethra na nagpapahirap sa pag-ihing. Hindi tulad ng simpleng pagpapalawak o pagputol ng pagsikip na maaaring bumalik, ang urethroplasty ay **nagtatayo muli** ng urethra sa normal na lapad — ang pinakamaasahang paraan, na may tagumpay na **85–95%**. Ang pamamaraan ay nakasalalay sa lokasyon at haba ng pagsikip:

- Ang **hiwa** ay maaaring sa **ari (penis)**, sa lugar sa pagitan ng scrotum at puwit (**perineum**), o pareho — depende sa lokasyon ng pagsikip.
- Ang **maikling** pagsikip ay maaaring **alisin at itahi ang malusog na mga dulo**.
- Ang **mas mahabang** pagsikip ay **pinapalawak gamit ang graft** — karaniwang piraso ng laman mula sa loob ng pisngi (may sariling handout ito).

Sasabihin ng inyong siruhano kung aling paraan ang angkop sa inyong pagsikip.

Ligtas Ba Ito?

Ang urethroplasty ay kilala at mabisang operasyon; karamihan sa mga pasyente ay may maayos at bukas na urethra pagkatapos. Tulad ng anumang operasyon, may mga posibleng panganib — pagdurugo, impeksiyon, o pagbabalik ng pagsikip (karaniwang maaaring gamutin ulit). Ang epekto sa erection o ejaculation ay bihira at karaniwang pansamantala.

MGA TERMINO

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Stricture

Peklat na nagpapasikip ng urethra at nagpapabagal ng ihi.

Urethroplasty

Operasyon para itayo muli ang urethra sa normal na lapad.

Graft

Maliit na piraso ng sariling laman (madalas mula sa loob ng pisngi) para palawakin ang urethra.

Perineum

Ang lugar sa pagitan ng scrotum at puwit, kung saan madalas ginagawa ang hiwa.

Catheter

Malambot na tubo na inilalagay sa urethra nang ~1–4 na linggo habang gumagaling ang tahi.

Urethrogram

X-ray ng urethra para suriin kung nagaling na ang tahi bago alisin ang catheter.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nagpapawala ng sakit habang nasa operasyon.

MASAKIT BA? Ginagawa sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, namamaga, may pasa, at masakit ang lugar ng hiwa (ari at/o perineum) nang ilang linggo — nakatutulong ang yelo, scrotal support, at pain medicine. May catheter kayo paggising. Karaniwang 2–4 oras.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Ginagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno at kung aling gamot ang ihihinto, kasama ang blood thinners).
- Ang **pagsusuri ng ihi** ay naghahanap ng impeksiyon — kailangang gamutin muna ang anumang impeksiyon.
- **Huwag manigarilyo** — nagpapabagal ito ng paggaling. Kung gagamitin ang cheek graft, maaaring kailanganin ng dental cleaning.
- Maghanda para sa **catheter pagkatapos (~1–4 na linggo)** at magsayos ng sasakyan pauwi.

Sabihin sa inyong care team bago ang operasyon kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**, o may kasalukuyang impeksiyon sa ihi o balat
- Nakaranas na ng nakaraang operasyon sa urethra, radiation, o kondisyon sa balat tulad ng lichen sclerosus

Ano ang Nangyayari Habang Nasa Operasyon

- 1 Natutulog kayo o hindi nakakaramdam mula baywang pababa sa ilalim ng anesthesia; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Gumagawa ng hiwa ang siruhano sa lugar ng pagsikip (ari, perineum, o pareho) at binubuksan ang peklat na bahagi.
- 3 Inaayos ang pagsikip — inalis at tinatahi ang mga malusog na dulo, o pinapalawak gamit ang graft.
- 4 Inilalagay ang **catheter** para maalisan ang ihi at protektahan ang tahi habang gumagaling; isinasara ang mga hiwa.

Pagkatapos ng Operasyon

- Uuwi kayo na may **catheter**, karaniwang nang **~1–4 na linggo**. Ituturo ng care team kung paano alagaan ito — huwag hilahin.
- Ang pamamaga, pasa, at kaunting **dugo sa ihi** sa paligid ng catheter ay normal sa una.
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pag-iikot, pagbibisikleta, at sex** nang ilang linggo (~6) para mabigyan ng pagkakataon ang tahi na gumaling.
- Bago alisin ang catheter, karaniwang gagawin ng **X-ray ng urethra** para kumpirmahin na nagaling na ang tahi.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Ang catheter ay **natanggal, naharang, o hindi na tumatulo**
- Lagnat o panginginig, o lumalaking pamumula, sakit, o tulo sa lugar ng hiwa
- Matinding pagdurugo, o **hindi makapagihi** pagkatapos alisin ang catheter

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Itinatayo muli ng urethroplasty ang pagsikip ng urethra at ito ang pinakamatibay na solusyon. Ang hiwa ay maaaring sa ari, perineum, o pareho, at maaaring gumamit ng graft mula sa pisngi — ipapaliwanag ng siruhano ang inyong operasyon.
2. Para maghanda: sundin ang tagubilin sa pag-aayuno at gamot, gamutin muna ang anumang impeksiyon, huwag manigarilyo, at maghanda para sa catheter pagkatapos (~1–4 na linggo).
3. Panatilihin ang catheter hanggang alisin ng care team (karaniwang pagkatapos ng healing X-ray), at iwasan ang mabigat na gawain at sex nang ilang linggo.