

Urinary Diversion — Paghahambing ng mga Opsyon

Impormasyon para sa Pasyente · Tatlong paraan para dalhin ang ihi kapag nawala o hindi na gumagana ang pantog

WARWIKI

Kapag ang pantog ay tinanggal o hindi na gumagana, kailangan ng bagong daan para lumabas ang ihi — ito ang tinatawag na urinary diversion. May tatlong pangunahing uri. Gumagamit ang bawat isa ng piraso ng inyong sariling bituka at pinaka-naiiba sa **kung paano kayo nagpapalabas ng ihi araw-araw**: bag sa tiyan, pag-ihing sa urethra, o paggamit ng catheter. Inihahambing ng sheet na ito ang tatlo; may sariling detalyadong handout ang bawat isa.

Ang Tatlong Opsyon

MAY SUOT NA BAG

Ileal Conduit (Bricker)

Isang maikling piraso ng bituka ang nagdadala ng ihi sa isang maliit na bukas (**stoma**) sa tiyan, kung saan ito tuluy-tuloy na dumadaan sa isang magaang na **bag** na inyong binubuksan at pinapalitan. Pinakasimple at pinakakaraniwan; walang kontrolin o i-catheterize.

UMIHI SA URETHRA · WALANG BAG

Orthotopic Neobladder

Isang bagong supot na gawa sa bituka ang ikinonekta sa inyong **urethra**, kaya umihi kayo sa natural na paraan nang walang bag. Natututo kayong lumabas ng ihi ayon sa **iskedyul** (umaga at gabi), maaaring kailanganin ang catheter paminsan-minsan, at karaniwan ang pagtagas sa simula.

GINAGAMIT ANG CATHETER · WALANG BAG

Continent Cutaneous (Indiana Pouch)

Isang panloob na supot mula sa bituka ang nag-iimbak ng ihi, na may maliit na hindi tumatawid na bukas (kadalasan sa **pusod**). Walang bag — nagpapalabas kayo ng ihi sa pamamagitan ng **catheter** ilang beses sa isang araw.

MGA TERMINO

Urinary diversion

Bagong landas para lumabas ang ihi kapag nawala o hindi na gumagana ang pantog.

Stoma

Maliit na bukas sa balat, gawa sa bituka, na pinagdadaan ng ihi.

Conduit

Maikling piraso ng bituka na nagdadala ng ihi sa stoma (hindi nagtatago ng ihi).

Neobladder

Bagong pantog na gawa sa bituka at ikinonekta sa urethra.

Continent

Hindi tumatawid — kayo ang nagkokontrol kung kailan ito alisan.

Incontinent diversion

Tuluy-tuloy na dumadaan sa bag (ang ileal conduit).

Catheterize

Maglagay ng manipis na tubo para palabasin ang ihi.

Mucus

Malagkit na likido na ginagawa ng bituka; normal ang makakita ng nito sa ihi pagkatapos ng anumang diversion.

ANO ANG ANGKOP PARA SA AKIN? Ang pinakamainam na pagpili ay nakasalalay sa inyong anatomy, kakayahan ng bato, iba pang kondisyon sa kalusugan, at lakas ng kamay at kakayahang makakita (kailangan para sa pag-catheterize) — pati na rin ang inyong pamumuhay at kung ano ang pinakamahalagang bagay sa inyo. Hindi lahat ay angkop sa bawat uri. Sasabihin ng inyong siruhano kung aling mga opsyon ang ligtas para sa inyo.

Paghahambing ng mga Opsyon

	Ileal Conduit	Neobladder	Continent (Indiana)
Paano palabasin	Automatic na lumalabas	Umihi sa urethra	Catheter sa stoma
May bag?	Oo	Hindi	Hindi
Kailangan ng catheter?	Hindi	Minsan	Lagi, bawat 4–6 h
Laki ng operasyon	Pinakamaliit	Mas malaki	Mas malaki
Pang-araw-araw	Alisan at palitan ang bag	Nakatakdang pag-ihi, umaga at gabi	Catheterize at banlawan

Mga Tanong para sa inyong Siruhano

- Sa aling mga opsyon ako **karapat-dapat**, at alin ang inyong inirerekomenda?
- Ano ang magiging hitsura ng **pang-araw-araw na buhay** at pag-aalaga sa sarili sa bawat isa?
- Paano ito makakaapekto sa **trabaho, ehersisyo, tulog, at intimacy**?
- Ano ang mga pangunahing **panganib** at posibilidad na kailangan ng isa pang operasyon sa hinaharap?

Pareho para sa Lahat ng Tatlo

- Ginagamit ang piraso ng inyong **sariling bituka**, kaya kailangan ng ilang araw para mabawi ang digestive system pagkatapos ng operasyon.
- Normal ang **mucus** sa ihi — ginagawa ito ng bituka.
- Kailangan ng **panghabambuhay na follow-up**, kasama ang pag-check ng **vitamin B12** (maaaring mabawasan ang B12 sa paglipas ng mga taon).
- Uminom ng maraming tubig** para mapanatiling malinis ang sistema.

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- May tatlong paraan ng urinary diversion — isang **bag** (ileal conduit), pag-ihi sa **urethra** (neobladder), o paglabas ng ihi sa pamamagitan ng **catheter** sa maliit na bukas (Indiana pouch).
- Pinakamalaking pagkakaiba nila ay ang **pang-araw-araw na pag-aalaga**. Ang pinakamainam ay nakasalalay sa inyong kalusugan at kung ano ang mahalaga sa inyo — at hindi lahat ay karapat-dapat sa bawat uri.
- Gumagamit ng bituka ang tatlo, kaya lahat ay may mucus sa ihi, ilang araw na pahinga para sa digestive system, at panghabambuhay na follow-up. Basahin ang detalyadong handout para sa opsyong inyong pinili.