

Escape intestinal accidental (Incontinencia fecal)

WARWIKI

Información para el paciente · Perder el control de los gases o las heces — común y tratable

El escape intestinal accidental significa perder el control de los gases o las heces — tener un escape antes de llegar al baño o sin darse cuenta. Es mucho más común de lo que la gente cree, en especial después del parto o con la edad, y tiene tratamiento. No hay nada de qué avergonzarse, y contárselo a su equipo es el primer paso para mejorar.

Acerca de esta afección

El control de las heces depende de los **músculos del esfínter anal**, el suelo pélvico, la consistencia de las heces y los nervios que los coordinan. Un problema en cualquiera de ellos puede causar escapes — desde manchado y gases hasta la pérdida de heces formadas.

Qué la causa

- **Lesión del esfínter** — con frecuencia por el parto (un desgarro grave) o una cirugía anal previa
- **Heces blandas o diarrea** — más difíciles de retener que las heces formadas
- **Estreñimiento grave** con escape por rebosamiento alrededor de heces duras
- **Problemas de los nervios**, prolapso del recto o intestino irritable

A menudo hay más de un factor involucrado, y varios se pueden mejorar.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia fecal

Pérdida accidental de gases o heces.

Esfínter anal

El anillo de músculo que retiene las heces hasta que usted decide ir.

OASIS

Un desgarro grave del parto (de 3.º/4.º grado) que afecta el esfínter.

Fibra

Agente que da volumen, endurece las heces blandas y reduce los escapes.

Biorretroalimentación

Terapia que vuelve a entrenar los músculos del suelo pélvico y del esfínter.

Neuromodulación sacra

Un tratamiento de estimulación de los nervios que puede mejorar el control.

¿DE VERDAD HAY ALGO QUE AYUDE? Sí — la mayoría de las personas mejoran mucho, a menudo con pasos sencillos como endurecer las heces y volver a entrenar los músculos. Las opciones más avanzadas funcionan bien cuando se necesitan. Lo más difícil es mencionarlo; una vez que lo hace, hay un camino claro hacia un mejor control.

Cómo se diagnostica

- Un historial de con qué frecuencia, en qué cantidad y qué provoca los escapes
- Un examen del esfínter anal y del suelo pélvico
- A veces una ecografía del esfínter, pruebas anorrectales o una endoscopia

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 Control de las heces** — agregue fibra para endurecer las heces, trate la diarrea o el estreñimiento y establezca una rutina intestinal regular.
- 2 Terapia del suelo pélvico / biorretroalimentación** para fortalecer y coordinar los músculos.
- 3 Medicamentos** (como los antidiarreicos) cuando las heces están blandas.
- 4 Opciones avanzadas** — neuromodulación sacra, un agente de relleno inyectable o reparación del esfínter.

Vivir con esto

- Procure tener **heces bien formadas** con fibra y líquidos constantes.
- Vacíe a horas regulares; proteja la piel y lleve suministros para mayor tranquilidad.
- Anote qué alimentos empeoran los escapes (cafeína, picantes, edulcorantes artificiales).

Llame a su equipo si tiene:

- **Sangre en las heces** o heces negras y alquitranadas
- Un cambio nuevo o marcado en los hábitos intestinales, o pérdida de peso sin explicación
- Fiebre o dolor abdominal intenso

TRES COSAS PARA RECORDAR

- 1.** El escape intestinal accidental es común y tratable — no es algo con lo que tenga que vivir ni que deba callar.
- 2.** El tratamiento comienza con endurecer las heces y volver a entrenar los músculos, y luego avanza a la estimulación de los nervios o la reparación si es necesario.
- 3.** Cuéntele a su equipo — es el paso clave. Informe si hay sangre en las heces, pérdida de peso o un gran cambio en los hábitos intestinales.