

Disfunción eréctil (DE)

Información para el paciente · Un problema común y tratable — y una señal de la salud del corazón

WARWIKI

La disfunción eréctil (DE) es la dificultad para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales satisfactorias, con la frecuencia suficiente como para ser un problema. Es muy común y aumenta con la edad — y se puede tratar muy bien. Como las erecciones dependen de un buen flujo de sangre, la DE también puede ser una **señal de alerta temprana de enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos**, por eso vale la pena evaluarla.

Qué la causa

Las erecciones necesitan que los vasos sanguíneos, los nervios, las hormonas y el estado de ánimo funcionen juntos de forma saludable. La DE casi siempre tiene más de una causa:

- **Flujo de sangre** (la más común) — comparte factores de riesgo con la enfermedad del corazón: diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, fumar y el exceso de peso.
- **Nervios** — después de una cirugía de próstata o de la pelvis, por diabetes o por problemas de la columna.
- **Hormonas** — testosterona baja.
- **Medicamentos y estado de ánimo** — algunos medicamentos, además del estrés, la ansiedad, la depresión o las tensiones en la relación.

Un chequeo de la salud del corazón

Como las arterias pequeñas del pene pueden mostrar problemas primero, una DE nueva es una buena razón para revisar la presión arterial, el azúcar en la sangre y el colesterol — tratar esto ayuda a su corazón **y** a sus erecciones.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Disfunción eréctil (DE)

Dificultad para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales.

Vascular

Relacionado con el flujo de sangre — la causa más común de la DE.

Inhibidor de la PDE5

Las pastillas de primera línea para la DE (sildenafil, tadalafil, etc.).

Dispositivo de vacío (VED)

Una bomba que atrae sangre al pene para crear una erección.

Inyección intracavernosa

Una autoinyección que produce una erección.

Implante de pene

Un dispositivo quirúrgico para la DE que no mejora con otras opciones.

¿SE PUEDE SOLUCIONAR? Casi siempre, sí — la DE es una de las afecciones más tratables de la salud del hombre, con opciones que van desde pastillas hasta dispositivos y cirugía. El tratamiento es una **escalera**: empieza con lo más sencillo y avanza solo si hace falta, y hay una opción eficaz en cada nivel.

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 **Estilo de vida y salud** — hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar y controlar la diabetes y la presión arterial mejoran de verdad las erecciones; revise los medicamentos que puedan contribuir.
- 2 **Pastillas (inhibidores de la PDE5)** — el primer tratamiento habitual.
- 3 **Dispositivo de vacío, inyecciones o un supositorio uretral** — opciones eficaces si las pastillas no son suficientes.
- 4 **Testosterona** si está baja; **orientación psicológica** para el estrés o los factores de la relación.
- 5 **Implante de pene** — una opción quirúrgica confiable cuando las demás no funcionan. Cada opción tiene su propia hoja informativa.

Cómo se evalúa

- Una historia clínica (incluyendo el riesgo cardíaco y los medicamentos) y un examen
- Análisis de sangre — azúcar en la sangre, testosterona, colesterol

Bueno saber

- La comunicación con la pareja y tratar el estado de ánimo y la ansiedad ayudan mucho.
- Tenga cuidado con los “suplementos” no comprobados que se venden por internet — algunos contienen medicamentos ocultos.

Busque atención si tiene:

- DE con **dolor en el pecho** o falta de aire al hacer esfuerzo — hágase un chequeo del corazón
- DE que comenzó **de repente después de una lesión** en la pelvis o el pene
- Con los tratamientos: una erección que dura **más de 4 horas** (emergencia)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La DE es muy común y se trata muy bien, con una opción eficaz en cada paso, desde pastillas hasta implantes.
2. Puede ser una señal temprana de enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos — una evaluación ayuda a su salud en general, y los cambios en el estilo de vida mejoran las erecciones.
3. Empiece la conversación con su equipo. Busque atención si tiene DE con dolor en el pecho, o una erección de más de 4 horas con el tratamiento.