

La vejiga hiperactiva es una afección común y tratable en la que el músculo de la vejiga se contrae cuando no debería. Esto causa unas **ganas repentinas y fuertes de orinar**, orinar a menudo, despertarse por la noche para ir al baño y, a veces, escapes antes de llegar al inodoro. **No** es una parte normal del envejecimiento, y hay muchas maneras de mejorarla.

Acerca de esta afección

Normalmente la vejiga se llena con calma y le avisa cuando se está llenando. Con la vejiga hiperactiva, la vejiga envía una señal de “urgencia” demasiado pronto o con demasiada fuerza. Los síntomas principales son:

- **Urgencia** — una necesidad repentina y difícil de controlar de orinar
- **Frecuencia** — orinar más de unas 8 veces al día
- **Nicturia** — despertarse por la noche para orinar
- **Escapes por urgencia** — a veces, escapes camino al baño

Qué la causa

A menudo no hay una sola causa — es un problema en las señales entre la vejiga y el cerebro. Cosas que pueden provocarla o empeorarla son la **cafeína y el alcohol**, el estreñimiento, el sobrepeso, algunos medicamentos y (en las mujeres) la menopausia. Una infección de orina puede causar los mismos síntomas, así que eso se revisa primero. A veces interviene una afección de los nervios.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Vejiga hiperactiva

Urgencia y frecuencia al orinar porque la vejiga se contrae demasiado pronto.

Urgencia

Una necesidad repentina y fuerte de orinar, difícil de aguantar.

Frecuencia

Necesidad de orinar muchas veces durante el día.

Nicturia

Despertarse del sueño para orinar.

Incontinencia de urgencia

Escape de orina junto con unas ganas fuertes.

Diario miccional

Un registro sencillo de líquidos, idas al baño y escapes.

Suelo pélvico

Los músculos que puede entrenar para ayudar a controlar la vejiga.

Entrenamiento vesical

Alargar poco a poco el tiempo entre idas al baño para calmar la urgencia.

¿MEJORARÁ? Sí — la mayoría de las personas mejoran. El tratamiento suele empezar con cambios sencillos y entrenamiento vesical, y sube de nivel solo si hace falta. Puede tardar unas semanas en notarse la diferencia, así que dele tiempo a cada paso y siga trabajando con su equipo para encontrar lo que mejor le funcione.

Cómo se diagnostica

- Una conversación sobre sus síntomas y un **diario miccional**
- Un **análisis de orina** para descartar infección o sangre
- Una revisión de qué tan bien vacía la vejiga (una ecografía rápida)
- A veces, más pruebas (urodinamia o una cistoscopia) si el cuadro no está claro o si otros tratamientos no han funcionado

Cómo se trata (paso a paso)

- 1 Estilo de vida y entrenamiento** — reducir la cafeína y el alcohol, controlar los líquidos, tratar el estreñimiento, bajar el exceso de peso y hacer **entrenamiento vesical** y **ejercicios del suelo pélvico**.
- 2 Medicamentos** — pastillas que calman el músculo de la vejiga.
- 3 Opciones avanzadas** — **Bótox** en la vejiga, o **estimulación de los nervios** (PTNS o neuromodulación sacra). Cada una tiene su propia hoja informativa.

Vivir con vejiga hiperactiva

- Lleve un **diario miccional** unos días para detectar lo que la provoca.
- Tome líquidos de forma constante; no los reduzca tanto que la orina se concentre.
- Use **idas programadas** al baño y los trucos para “controlar la urgencia” (deténgase, apriete el suelo pélvico, respire y luego vaya) que su equipo le enseñe.

Llame a su equipo si tiene:

- **Sangre en la orina**, o dolor o ardor al orinar
- Fiebre, o dolor de espalda o del costado (posible infección)
- Si de repente **no puede orinar**

TRES COSAS PARA RECORDAR

- 1.** La vejiga hiperactiva — urgencia, frecuencia, idas nocturnas y a veces escapes — es común y tratable, no una parte normal del envejecimiento.
- 2.** El tratamiento sube de nivel poco a poco: primero estilo de vida y entrenamiento vesical, luego medicamentos, y después Bótox o estimulación de los nervios.
- 3.** Un diario miccional ayuda a hallar lo que la provoca; dele unas semanas a cada paso. Llame si hay sangre en la orina, dolor, fiebre o si no puede orinar.