

Enfermedad de Peyronie

WARWIKI

Información para el paciente · Tejido cicatricial que dobla el pene — y qué ayuda

La enfermedad de Peyronie es una afección en la que se forma una zona de tejido cicatricial (una **placa**) en la pared del pene, lo que hace que se **curve, se estreche, se hunda o se acorte**, a veces con dolor durante las erecciones. Puede dificultar las relaciones sexuales. Es común, **no es cáncer** y existen tratamientos eficaces — el adecuado depende de la etapa.

Acerca de esta afección

La enfermedad de Peyronie suele pasar por dos fases:

- **Fase activa (aguda)** — la curva está cambiando y puede haber dolor, a menudo durante 6–18 meses.
- **Fase estable** — la curva y la placa se han asentado y el dolor por lo general ha disminuido.

Las opciones de tratamiento dependen de la fase en la que se encuentra, por eso su equipo le preguntará cómo han cambiado las cosas con el tiempo.

Qué la causa

Se cree que ocurre después de un pequeño doblez o lesión durante las relaciones sexuales que sana con una cicatriz anormal en lugar de tejido normal. Es más común con la edad, con la diabetes, después de una cirugía de próstata y en los hombres que también tienen **contractura de Dupuytren** (una afección similar de cordones en la mano).

APRENDA LOS TÉRMINOS

Enfermedad de Peyronie

Tejido cicatricial en el pene que causa curvatura o deformidad.

Placa

La zona de tejido cicatricial responsable del doblez.

Activa vs. estable

Si la curva sigue cambiando o ya se ha asentado.

Terapia de tracción

Un dispositivo que estira suavemente el pene para mejorar la curva o la longitud.

Colagenasa (Xiaflex)

Un medicamento inyectable que descompone la placa.

Plicatura / injerto

Formas quirúrgicas de enderezar el pene.

¿DEBO APRESURARME A OPERARME? Por lo general, no. En la **fase activa**, la curva todavía está cambiando, así que el enfoque es el alivio y las opciones no quirúrgicas. La cirugía para enderezar se ofrece una vez que las cosas están **estables** (por lo general después de que la curva se haya mantenido firme y el dolor haya disminuido). Muchos hombres mejoran sin una operación.

Cómo se diagnostica

- Un historial de la curva, el dolor y cómo ha cambiado
- Un examen para palpar la placa; a veces fotos de una erección o una evaluación en el consultorio
- En ocasiones, una ecografía para mapear la placa y el flujo de sangre

Cómo se trata (según la fase)

- 1 **Fase activa** — tranquilizar, controlar el dolor y, con frecuencia, **terapia de tracción**; el objetivo es limitar el empeoramiento.
- 2 **Inyecciones en la placa** — medicamentos como la **colagenasa (Xiaflex)** que se inyectan en la placa para reducir la curva.
- 3 **Cirugía (fase estable)** — **plicatura** (coser el lado más largo; la más simple, puede acortar) o **incisión de la placa con injerto** (preserva la longitud, para curvas severas).
- 4 **Implante de pene** — si también hay disfunción eréctil. Cada opción tiene su propia hoja.

Bueno saber

- No trate de “enderezarlo” a la fuerza — eso puede empeorar la lesión.
- Una curvatura que no impide las relaciones sexuales simplemente puede vigilarse.
- La enfermedad de Peyronie puede afectar el ánimo y las relaciones — el apoyo ayuda.

Consulte a su equipo si tiene:

- Una curvatura que **impide las relaciones sexuales** o un doblez que empeora
- **Dolor** importante con las erecciones
- Nueva **disfunción eréctil** junto con la curva

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La enfermedad de Peyronie es tejido cicatricial que dobla el pene — común, no es cáncer y es tratable.
2. El tratamiento depende de la fase: alivio y opciones no quirúrgicas mientras está activa; procedimientos para enderezar una vez estable.
3. Muchos hombres mejoran sin cirugía. Consulte a su equipo si tiene un doblez que impide las relaciones sexuales, dolor continuo o nueva disfunción eréctil.