

Infecciones Urinarias (IU)

WARWIKI

Información para el paciente · Qué es una infección urinaria, cómo se trata y cómo prevenirla

Una infección urinaria ocurre cuando crecen bacterias en las vías urinarias. La mayoría son infecciones de la **vejiga**, que causan ardor, urgencia y orinar con frecuencia. Con menos frecuencia la infección llega a un **riñón**, lo cual es más grave. La mayoría de las infecciones urinarias se curan rápido con el antibiótico adecuado, y hay buenas maneras de prevenir las repeticiones.

Acerca de esta afección

Una infección de la vejiga (**cistitis**) suele causar:

- **Ardor o escozor** al orinar
- **Urgencia y frecuencia** — orinar a menudo y en poca cantidad
- Orina turbia, oscura o con olor fuerte; molestia en la parte baja del vientre

Una **infección del riñón** (pielonefritis) es más grave y añade **fiebre, escalofríos, dolor de espalda o del costado y náuseas** — esto requiere atención pronta.

Qué la causa

Las bacterias (por lo general del intestino) entran por la uretra y crecen en la vejiga. Cosas que aumentan el riesgo incluyen las **relaciones sexuales**, la **menopausia** (menos estrógeno), no vaciar bien la vejiga, las sondas, las piedras y la diabetes.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Infección urinaria

Una infección en cualquier parte de las vías urinarias.

Cistitis

Una infección de la vejiga — la infección urinaria más común.

Pielonefritis

Una infección del riñón — más grave, a menudo con fiebre.

Urocultivo

Una prueba que cultiva las bacterias para elegir el antibiótico adecuado.

Infección urinaria recurrente

Infecciones repetidas (a menudo 2 o 3 o más en un año).

Estrógeno vaginal

Una crema o pastilla en dosis baja que reduce el riesgo tras la menopausia.

Bacteriuria asintomática

Bacterias en la orina sin síntomas — por lo general no se trata.

¿SIEMPRE NECESITO ANTIBIÓTICOS? Si tiene síntomas, una infección urinaria se trata con antibióticos. Pero si un análisis de orina encuentra bacterias y usted se siente **bien**, por lo general **no** se trata — en ese caso los antibióticos hacen más daño que beneficio. Las excepciones importantes son el embarazo y antes de ciertos procedimientos urinarios.

Cómo se diagnostica y se trata

- Su equipo confirma una infección urinaria con sus **síntomas** más un **análisis o cultivo de orina**.
- Una infección de la vejiga se trata con un **ciclo corto de antibióticos**.
- Una **infección del riñón** puede necesitar un antibiótico más fuerte o más prolongado, y a veces atención hospitalaria.
- Termine todo el ciclo, aunque ya se sienta mejor.

Prevenir infecciones repetidas

- **Tome bastante agua** y no aguante la orina por mucho tiempo.
- Orine después de las relaciones sexuales; límpiense de adelante hacia atrás.
- Después de la menopausia, el **estrógeno vaginal** puede reducir el riesgo.
- Pregunte por opciones sin antibióticos, y por antibióticos preventivos solo si las infecciones son frecuentes.

Bueno saber

- Los productos de arándano y la D-manosa ayudan a algunas personas; la evidencia es variada — es razonable probarlos.
- Las infecciones repetidas a veces llevan a buscar una causa (vaciado incompleto, piedras).
- Si tiene una sonda, se espera que haya algunas bacterias — el tratamiento se basa en los síntomas, no solo en la prueba.

Busque atención pronto si tiene:

- **Fiebre, escalofríos o dolor de espalda o del costado** (posible infección del riñón)
- Náuseas o vómitos, o si se siente muy mal
- **Sangre visible en la orina**, o síntomas que no mejoran con el antibiótico
- Si está embarazada y tiene cualquier síntoma de infección urinaria

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La mayoría de las infecciones urinarias son de la vejiga (ardor, urgencia) y se curan con un ciclo corto de antibióticos; las del riñón (fiebre, dolor del costado) son más graves.
2. Las bacterias en la orina **sin síntomas** por lo general no se deben tratar — salvo en el embarazo o antes de ciertos procedimientos.
3. Prevenga las repeticiones con líquidos, orinando después de las relaciones y (tras la menopausia) con estrógeno vaginal. Busque atención si hay fiebre, dolor del costado o vómitos.