

सिस्टोस्कोपी (Cystoscopy) में आपके सर्जन एक पतली दूरबीन — जिसमें छोटा camera और रोशनी लगी होती है — को प्राकृतिक मूत्र-मार्ग से मूत्राशय के अंदर डालकर जाँचते हैं। इससे पेशाब में खून, बार-बार संक्रमण, संकुचन (stricture), या अन्य मूत्राशय की समस्याओं का कारण पता चलता है — और किसी मरम्मत की जाँच भी की जा सकती है।

इस जाँच के बारे में

Cystoscope एक पतली नली होती है जिसके सिरे पर camera लगा होता है। यह दो प्रकार की होती है:

- **Flexible (मुड़ने वाली) cystoscope** — आमतौर पर क्लिनिक में, आप जागते हुए, सुन्न करने वाले gel के साथ उपयोग की जाती है।
- **Rigid (सीधी) cystoscope** — ऑपरेशन थिएटर में, एनेस्थीसिया में उपयोग होती है; इससे एक ही बार में समस्या का इलाज भी हो सकता है।

मूत्राशय की दीवारें स्पष्ट दिखें इसलिए sterile तरल पदार्थ डाला जाता है। सर्जन सिस्टोस्कोपी इन कारणों से कर सकते हैं:

- **पेशाब में खून** या बार-बार होने वाले संक्रमण का कारण जानना
- **संकुचन (stricture)**, पथरी, या वृद्धि देखना
- मरम्मत की जाँच करना, या छोटा ऊतक नमूना (biopsy) लेना
- **Stent** या टाँका लगाना, जाँचना, या निकालना

क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। सिस्टोस्कोपी यूरोलॉजी की सबसे सामान्य जाँचों में से एक है और इसमें जोखिम बहुत कम है। अधिकतर लोगों को केवल थोड़ी देर की असुविधा होती है। कभी-कभी मूत्र संक्रमण (UTI), थोड़ा रक्तस्राव, या जलन जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं — ये आमतौर पर हल्के होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं।

शब्दों को समझें

Cystoscope

Camera और रोशनी लगी पतली दूरबीन जो मूत्राशय के अंदर देखने के लिए उपयोग होती है।

मूत्राशय (Bladder)

वह मांसपेशीय थैली जो पेशाब तब तक रखती है जब तक आप पेशाब नहीं करते।

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जिससे पेशाब शरीर से बाहर निकलता है।

Flexible बनाम Rigid

मुड़ने वाला scope (जागते हुए, क्लिनिक में) या सीधा scope (एनेस्थीसिया में, ऑपरेशन थिएटर में)।

सुन्न करने वाला Gel

मूत्रमार्ग में लगाया जाने वाला लोकल एनेस्थीसिया जिससे scope आराम से जाता है।

Biopsy

ऊतक का छोटा नमूना जो microscope से जाँचने के लिए लिया जाता है।

Stent

एक मुलायम नली जो मार्ग खुला रखती है; जाँच के दौरान लगाई या निकाली जा सकती है।

Post-void residual

पेशाब करने के बाद मूत्राशय में बचे पेशाब की मात्रा।

क्या इसमें दर्द होगा? Flexible scope से गुजरते समय आपको थोड़ा दबाव या जलन महसूस हो सकती है — सुन्न करने वाला gel इसमें मदद करता है, और क्लिनिक की जाँच आमतौर पर कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है। Rigid scope में आप एनेस्थीसिया में होते हैं और कुछ भी महसूस नहीं होता। जब भी असुविधा हो, टीम को बताएँ।

तैयारी कैसे करें (जाँच से पहले)

- **क्लिनिक (flexible)** सिस्टोस्कोपी के लिए आमतौर पर आप **खाना-पीना जारी रख सकते हैं**, अपनी सामान्य दवाएँ ले सकते हैं, और खुद गाड़ी चला सकते हैं।
- **एनेस्थीसिया में** की जाने वाली जाँच के लिए सर्जरी के निर्देश पालें — उपवास, कौन सी दवाएँ रोकनी हैं, और घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ।
- संक्रमण जाँचने के लिए **पेशाब का नमूना** माँगा जा सकता है और **antibiotic** दी जा सकती है।

अपनी टीम को पहले से बताएँ यदि आप:

- **रक्त पतला करने वाली दवा** लेते हैं
- मूत्र संक्रमण (UTI) के लक्षण हों (जलन, बुखार, या बादलयुक्त/तेज गंध वाला पेशाब) — सक्रिय संक्रमण में जाँच स्थगित हो सकती है
- कोई एलर्जी हो, या पहले scope डालने में कठिनाई हुई हो

जाँच के दौरान क्या होता है

- 1 आप आराम से लेट जाते हैं और टीम आपको सही स्थिति में रखती है। उद्धाटन को साफ किया जाता है और सुन्न करने वाला gel लगाया जाता है।
- 2 Cystoscope को धीरे-धीरे मूत्रमार्ग से मूत्राशय तक ले जाया जाता है।
- 3 Sterile तरल पदार्थ डाला जाता है और सर्जन पूरी दीवार का निरीक्षण करते हैं।
- 4 Scope निकाल दिया जाता है। यदि इलाज, biopsy, या stent बदलना हो, तो यह scope निकालने से पहले किया जाता है।

बाद में

- क्लिनिक जाँच के बाद आमतौर पर आप **तुरंत सामान्य गतिविधियाँ** कर सकते हैं; एनेस्थीसिया के बाद आराम करें और घर के लिए कोई साथ होना चाहिए।
- एक-दो दिन तक **पेशाब करते समय हल्की जलन** हो सकती है। अधिक पानी पीने से यह जल्दी ठीक होती है।
- थोड़े समय के लिए पेशाब में **हल्का गुलाबी रंग** आ सकता है — यह सामान्य है और एक दिन में ठीक हो जाता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- पेशाब करने में कठिनाई, या बिल्कुल पेशाब न हो
- अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में खून के थक्के
- दर्द जो ठीक होने की बजाय बढ़ता जाए

याद रखने योग्य तीन बातें

1. सिस्टोस्कोपी एक त्वरित, सुरक्षित जाँच है जिसमें पतले camera से मूत्राशय और मूत्रमार्ग देखा जाता है — इससे समस्या का कारण या मरम्मत की स्थिति पता चलती है।
2. क्लिनिक जाँच के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं। एनेस्थीसिया वाली जाँच में उपवास के निर्देश पालें और किसी को साथ लाएँ। रक्त पतला करने वाली दवा या संक्रमण के लक्षण टीम को बताएँ।
3. एक दिन तक हल्की जलन या हल्का गुलाबी पेशाब सामान्य है — खूब पानी पिएँ, और बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब न होने पर तुरंत बुलाएँ।