

इलियल कंड्यूट मूत्राशय हटने या काम न करने के बाद पेशाब निकालने का एक तरीका है। सर्जन आपकी आँत का एक छोटा टुकड़ा उपयोग करते हैं जो गुर्दों से पेशाब को पेट पर एक छोटे छेद (stoma) तक ले जाता है, जहाँ से यह एक हल्के bag में जमा होता है। यह सबसे सरल और सबसे आम मूत्र परिवर्तन (urinary diversion) है।

इस प्रक्रिया के बारे में

आँत का **6-8 इंच का टुकड़ा** एक **नाली** की तरह काम करता है — यह पेशाब जमा नहीं करता। मूत्रवाहिनी (गुर्दों से आने वाली नलियाँ) इससे जोड़ी जाती हैं, और एक सिरा पेट की त्वचा पर **stoma** के रूप में निकाला जाता है, आमतौर पर पेट के निचले-दाएँ हिस्से में। चूँकि पेशाब **लगातार** निकलता रहता है, आप stoma पर एक हल्की **ostomy bag** पहनते हैं जिसे दिन में कई बार खाली करते हैं।

- **कोई नियंत्रण नहीं और कोई catheter नहीं** लगाना पड़ता।
- बाकी आँत को **फिर से जोड़ा** जाता है ताकि पाचन सामान्य रहे।
- एक **ostomy nurse** आपको stoma और bag की देखभाल सिखाती है।

क्या यह सुरक्षित है?

इलियल कंड्यूट 70 से अधिक वर्षों से मानक मूत्र परिवर्तन है — यह सबसे सरल और सबसे कम समय की सर्जरी है। किसी भी बड़ी सर्जरी की तरह इसमें जोखिम हैं (रक्तस्राव, संक्रमण, जोड़ पर रिसाव)। समय के साथ कुछ लोगों को stoma या त्वचा की समस्या, पेशाब में संक्रमण (UTI), या नमक/विटामिन में बदलाव हो सकता है — follow-up में इन पर नज़र रखी जाती है।

शब्दों को समझें

मूत्र परिवर्तन (Urinary diversion)

जब मूत्राशय न हो या काम न करे तो पेशाब निकालने का नया रास्ता।

इलियल कंड्यूट

आँत का एक छोटा टुकड़ा जो पेशाब को stoma तक ले जाता है।

Stoma

पेट पर छोटा छेद, जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है।

Ostomy bag

Stoma पर पहना जाने वाला थैला जो पेशाब इकट्ठा करता है।

मूत्रवाहिनी (Ureters)

गुर्दों से पेशाब लाने वाली नलियाँ, जो कंड्यूट से जोड़ी जाती हैं।

Ostomy nurse

विशेष नर्स जो stoma की जगह चुनती है और देखभाल सिखाती है।

Mucus

आँत से बनने वाला फिसलन भरा द्रव; पेशाब में धागे जैसा दिखना सामान्य है।

Peristomal skin

Stoma के आसपास की त्वचा, जिसे साफ और सुरक्षित रखना ज़रूरी है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में पेट में दर्द होता है और आँत को “जागने” में कुछ दिन लगते हैं (पहले तरल, फिर ठोस आहार)। Stoma में खुद कोई संवेदना नहीं होती। अधिकतर लोग लगभग 5-7 दिन अस्पताल में रहते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल एनेस्थीसिया** में होती है — सभी निर्देश मानें (उपवास, कौन सी दवाएँ बंद करनी हैं जैसे blood thinners)। **Bowel prep** भी हो सकता है।
- **Ostomy nurse** से मिलें, जो बैठकर, खड़े होकर और लेटकर आपके stoma की सबसे अच्छी जगह चुनती है — यह आरामदायक, रिसाव-मुक्त fit के लिए ज़रूरी है।
- **धूम्रपान न करें** — यह ठीक होने में देरी करता है — और घर पर मदद का इंतज़ाम करें।

अपनी टीम को पहले से बताएँ यदि आप:

- **Blood thinner** लेते हैं या कोई सक्रिय संक्रमण है
- **आँत की बीमारी** (जैसे Crohn's या colitis) है, या पहले पेट की सर्जरी या radiation हुई है

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए रहते हैं और antibiotics दी जाती हैं।
- 2 आँत का एक छोटा टुकड़ा अलग किया जाता है और बाकी आँत फिर से जोड़ दी जाती है।
- 3 मूत्रवाहिनियाँ इस आँत के टुकड़े से जोड़ी जाती हैं।
- 4 एक सिरा पेट से बाहर stoma के रूप में निकाला जाता है; ठीक होने तक soft stents और drain लगाई जाती है।

बाद में

- लगभग **5-7 दिन** में घर जाते हैं। Ostomy nurse आपको **bag खाली करना** (दिन में कई बार) और **appliance बदलना** (हर कुछ दिनों में) सिखाती है।
- पेशाब में **mucus** के धागे सामान्य हैं — आँत यही बनाती है।
- **खूब पानी पिएँ** और stoma के आसपास की त्वचा की देखभाल करें।
- लगभग **6 हफ्ते तक भारी सामान न उठाएँ**। जीवन भर जाँच (गुर्दे की कार्यक्षमता, विटामिन B12) ज़रूरी है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- Stoma का रंग **गहरा, नीला पड़ना या अंदर धँसना**
- कई घंटों तक bag में **बहुत कम या बिल्कुल पेशाब नहीं**
- तेज़ पेट दर्द, उल्टी, या **गैस या मल न आना**
- अधिक रक्तस्राव, या घाव में लालिमा या साव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. इलियल कंड्यूट आँत के एक छोटे टुकड़े से पेशाब को पेट के stoma पर bag में ले जाता है — सबसे सरल विकल्प, कोई catheter नहीं।
2. तैयारी: उपवास और bowel prep के निर्देश मानें, ostomy nurse से stoma marking करवाएँ, धूम्रपान न करें, घर पर मदद का इंतज़ाम करें।
3. पेशाब में mucus सामान्य है। Ostomy nurse bag और skin care सिखाएगी। बुखार, stoma का रंग बदलना, bag में पेशाब न आना, या पेट से गैस-मल न आने पर तुरंत संपर्क करें।