

इम्प्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस (IPP)

रोगी जानकारी · लिंग प्रत्यारोपण सर्जरी से पहले क्या उम्मीद करें

WARWIKI

इम्प्लेटेबल पेनाइल प्रोस्थेसिस (IPP) एक ऐसा उपकरण है जो पूरी तरह त्वचा के अंदर लगाया जाता है और आपको जब चाहें स्तंभन (erection) पाने देता है — उन पुरुषों के लिए जिनका स्तंभन दोष (ED) गोलियों, injections या अन्य उपचारों से ठीक नहीं हुआ। इसे अंडकोष (scrotum) में छुपे pump से नियंत्रित किया जाता है। यह handout बताता है कि यह कैसे काम करता है, कैसे तैयारी करें, और क्या उम्मीद करें।

इस प्रक्रिया के बारे में

जब **स्तंभन दोष (ED)** गोलियों, vacuum device, या injections से ठीक नहीं होता, तब implant सबसे भरोसेमंद अगला कदम है और इससे संतुष्टि बहुत अधिक होती है। तीन हिस्सों का यह उपकरण त्वचा के अंदर लगाया जाता है:

- लिंग के अंदर दो नरम **cylinders** जो fluid से भरकर उसे कड़ा बनाते हैं
- अंडकोष में एक **pump** जिसे दबाकर inflate और release करते हैं
- पेट के निचले हिस्से में fluid का **reservoir**

उपयोग कैसे करें: pump को कई बार दबाएँ ताकि cylinders भरें और erection हो; release valve दबाने पर लिंग फिर नरम हो जाता है। आप तय करते हैं कब और कितनी देर।

ज़रूरी बातें

यह एक **स्थायी निर्णय** है। implant लगाने के बाद erectile tissue बदल जाता है, इसलिए प्राकृतिक erection और अन्य ED उपचार (गोलियाँ, injections) काम नहीं करते — erection के लिए अब IPP ही उपाय होगा। यह **पेशाब, अनुभव (sensation), orgasm, या वीर्यपात (ejaculation) को नहीं बदलता**। हर implant की तरह इसमें कुछ जोखिम है — मुख्यतः संक्रमण (infection), और कई वर्षों बाद device बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है।

शब्दों को समझें

स्तंभन दोष (ED)

संभोग के लिए पर्याप्त erection न होना।

पेनाइल प्रोस्थेसिस (IPP)

लगाया गया उपकरण जो आपकी इच्छा पर erection देता है।

Cylinders

लिंग के अंदर के दो हिस्से जो fluid से भरकर उसे कड़ा बनाते हैं।

Pump

अंडकोष में वह हिस्सा जिसे दबाकर inflate और release करते हैं।

Reservoir

पेट के निचले हिस्से में रखा fluid का कंटेनर।

Activation

सर्जरी के ~4-6 हफ्ते बाद की visit जहाँ device पहली बार उपयोग किया जाता है और pump चलाना सिखाया जाता है।

Cycling

ठीक होने के बाद रोज़ inflate और deflate करना — device को ठीक रखता है और लंबाई बनाए रखता है।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको गहरी नींद में रखती है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया या spinal anesthesia में होती है, इसलिए दौरान कुछ नहीं लगता। बाद में 1-2 हफ्ते तक लिंग और अंडकोष में दर्द, सूजन, और नीलापन (bruising) रहेगा — scrotal support, बर्फ, और pain medicine से राहत मिलती है। सर्जरी लगभग एक घंटे की होती है और अधिकतर लोग उसी दिन घर जाते हैं। जब तक सर्जन activate न करें, device उपयोग न करें।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल या spinal anesthesia** में होती है — सभी surgery निर्देश मानें (खाली पेट रहना, कौन-सी दवाएँ रोकनी हैं, जैसे blood thinners)।
- **Infection रोकना बहुत ज़रूरी है:** कोई भी संक्रमण (जैसे UTI) पहले ठीक होगा; antiseptic soap से नहाएँ और antibiotics दी जाएँगी।
- **धूम्रपान / vaping बंद करें; diabetes** है तो टीम blood sugar नियंत्रण सुनिश्चित करेगी — दोनों infection का जोखिम कम करते हैं।

पहले से बताएँ अगर आपको:

- **Diabetes** है, या हाथों में कमजोरी है (pump आप खुद चलाते हैं)
- पहले pelvic या लिंग की सर्जरी, radiation, या कोई पुराना implant हुआ है

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए रहते हैं या कमर से नीचे सुन्न रहते हैं; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 एक छोटे चीरे (अंडकोष या पेट के पास) से सर्जन **cylinders** लिंग में, **pump** अंडकोष में, और **reservoir** पेट के निचले हिस्से में लगाते हैं — सब त्वचा के अंदर।
- 3 Device का परीक्षण होता है, फिर deflated छोड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए catheter लग सकता है।

बाद में

- 1-2 हफ्ते तक लिंग और अंडकोष में **सूजन और नीलापन** रहेगा। Scrotal support पहनें, बर्फ लगाएँ, pain medicine लें, चीरे को साफ और सूखा रखें।
- **सर्जन की अनुमति तक device या संभोग न करें** — आमतौर पर **4-6 हफ्ते** बाद। उस **activation visit** पर device पहली बार inflate होता है और pump चलाना सिखाया जाता है (deflate करना सबसे अधिक अभ्यास माँगता है)।
- उसके बाद पहले कुछ महीनों तक **रोज़ inflate-deflate करें ("cycling")** — device सुचारु रहता है और लंबाई बनी रहती है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या चीरे पर बढ़ती लालिमा, दर्द, सूजन, या discharge
- पेशाब न हो पाना
- तेज़ या बढ़ता दर्द, या लिंग का रंग काला या नीला पड़ना

याद रखने योग्य तीन बातें

1. IPP ED के लिए छुपा हुआ उपकरण है जब अन्य उपचार काम न करें — scrotal pump दबाएँ erection के लिए, release valve से नरम हो जाएगा।
2. यह एक **स्थायी निर्णय** है (बाद में प्राकृतिक erection और गोलियाँ/injections काम नहीं करतीं), लेकिन **पेशाब, sensation, orgasm, या ejaculation नहीं बदलता**।
3. Infection रोकना सबसे ज़रूरी है — कोई भी infection पहले ठीक करें, धूम्रपान न करें, antiseptic wash और antibiotics लें। Activation (~4-6 हफ्ते) तक device न चलाएँ, फिर रोज़ cycle करें।