

पुरुष स्लिंग (sling) एक मुलायम mesh की पट्टी है जो मूत्रमार्ग (urethra) के नीचे लगाई जाती है। यह खाँसने, वज़न उठाने या गतिविधि के दौरान होने वाले पेशाब के रिसाव का — जो अक्सर प्रोस्टेट सर्जरी के बाद होता है — इलाज करती है। यह मूत्रमार्ग को उठाकर सहारा देती है ताकि आप पेशाब को बेहतर रोक सकें। इसमें कोई pump या button नहीं होता।

इस प्रक्रिया के बारे में

गतिविधि, खाँसने या वज़न उठाने पर पेशाब का रिसाव **तनाव मूत्र असंयम (SUI)** कहलाता है, जो अक्सर प्रोस्टेट सर्जरी के बाद होता है। स्लिंग मूत्रमार्ग के नीचे एक मुलायम mesh पट्टी लगाकर उसे सामान्य स्थिति में उठाती है।

स्लिंग मूत्रमार्ग को **सहारा** देती है, दबाती नहीं — इसलिए ठीक होने के बाद आप **सामान्य रूप से पेशाब** करते हैं — कोई pump, button या उपकरण नहीं चलाना पड़ता।

ज़रूरी जानकारी

स्लिंग **हल्के-से-मध्यम** रिसाव में सबसे अच्छा काम करती है जब sphincter कुछ काम कर रहा हो। अधिक रिसाव में या **पेल्विक radiation** के बाद **कृत्रिम मूत्रमार्ग sphincter (AUS)** बेहतर विकल्प हो सकता है — सर्जन आपसे चर्चा करेंगे। स्लिंग रिसाव को **कम** कर सकती है, पूरी तरह बंद नहीं भी कर सकती; ज़रूरत पड़े तो बाद में AUS लगाया जा सकता है।

शब्दों को समझें

तनाव मूत्र असंयम (SUI)

गतिविधि, खाँसने या वज़न उठाने पर पेशाब का रिसाव।

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जिससे पेशाब शरीर से बाहर आता है।

स्लिंग (Sling)

मूत्रमार्ग के नीचे लगाई गई मुलायम mesh पट्टी।

Repositioning जाँच

छोटे camera से अंदर देखना कि मूत्रमार्ग को उठाने से फ़ायदा होगा।

मूत्र रुकावट

सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए पेशाब करने में कठिनाई; कैथेटर की ज़रूरत पड़ सकती है।

कृत्रिम sphincter (AUS)

pump वाला विकल्प, आमतौर पर अधिक रिसाव के लिए।

जनरल एनेस्थीसिया

सर्जरी के दौरान आपको पूरी तरह सुलाए रखने की दवा।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल या spinal एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में 1-2 हफ्तों तक groin और अंडकोष के पीछे वाले हिस्से में दर्द, सूजन और नील पड़ सकता है — बर्फ, scrotal support और दर्द की दवा से राहत मिलती है। सर्जरी लगभग एक घंटे की होती है और कई लोग उसी दिन घर जाते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल या spinal एनेस्थीसिया** दी जाएगी — उपवास और blood thinners रोकने सहित सभी निर्देशों का पालन करें।
- **पेशाब की जाँच (urine test)** से infection देखी जाती है (पहले इलाज होता है); **camera जाँच (cystoscopy)** पुष्टि करती है कि स्लिंग फ़ायदेमंद होगी।
- **धूम्रपान न करें**, वज़न और diabetes नियंत्रित रखें, निर्देशित antibiotics लें — स्लिंग एक mesh implant है।

सर्जरी से पहले अपनी टीम को बताएँ यदि:

- **पेल्विक radiation** हुई हो — तब स्लिंग कम असरदार हो सकती है, AUS बेहतर हो सकता है
- पहले incontinence की सर्जरी या मूत्रमार्ग संकुचन हुआ हो
- कहीं भी कोई infection हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए या कमर से नीचे सुन्न होते हैं; antibiotics दी जाती हैं।
- 2 groin और perineum में छोटे cuts से सर्जन mesh sling को मूत्रमार्ग के नीचे से गुज़ारकर उसे सही जगह उठाते हैं।
- 3 स्लिंग को anchor किया जाता है, cuts बंद होते हैं और थोड़े समय के लिए catheter लगाया जाता है।

बाद में

- 1-2 हफ्तों तक groin और perineum में **दर्द, सूजन और नील** रहेगा। बर्फ, scrotal support और दर्द की दवा लें।
- कई हफ्तों (लगभग 6) तक **भारी वज़न, straining, cycling और sex से बचें** — straining से स्लिंग ठीक से heal होने से पहले हिल सकती है।
- कुछ समय के लिए **पेशाब करने में कठिनाई** हो सकती है और catheter लग सकता है; यह ठीक हो जाता है।
- शुरू में pad इस्तेमाल करते रहें — सुधार अगले हफ्तों में आ सकता है। ठीक होने पर सामान्य रूप से पेशाब होगा, **कुछ operate नहीं करना**।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बिल्कुल **पेशाब न हो**
- बुखार, ठंड लगना, या cut के पास बढ़ती लाली, दर्द या discharge
- groin या perineum में बढ़ता दर्द

याद रखने योग्य तीन बातें

1. पुरुष स्लिंग मूत्रमार्ग के नीचे लगाई गई mesh पट्टी है जो प्रोस्टेट सर्जरी के बाद पेशाब नियंत्रण सुधारती है — कोई उपकरण operate नहीं करना।
2. यह **हल्के-से-मध्यम** रिसाव में सबसे अच्छा काम करती है; अधिक रिसाव या radiation के बाद AUS बेहतर है — ज़रूरत पड़ने पर बाद में भी लगाया जा सकता है।
3. कई हफ्तों तक **भारी वज़न, straining, cycling और sex से बचें**। अस्थायी रूप से पेशाब में कठिनाई हो सकती है — पेशाब बिल्कुल न हो या infection के लक्षण हों तो तुरंत call करें।