

मैलिएबल लिंग प्रत्यारोपण

रोगी जानकारी · स्तंभन दोष के लिए एक मोड़ने योग्य (semi-rigid) implant

WARWIKI

मैलिएबल लिंग प्रत्यारोपण — जिसे semi-rigid implant भी कहते हैं — दो मज़बूत, मोड़ने योग्य छड़ें हैं जो लिंग के अंदर लगाई जाती हैं। यह उन पुरुषों के लिए है जिनके स्तंभन दोष (ED) में गोलियों, injections या अन्य इलाज से सुधार नहीं हुआ। इसमें कोई pump नहीं होता — संभोग के लिए लिंग को ऊपर मोड़ें और छुपाने के लिए नीचे। यह handout बताता है कि यह कैसे काम करता है, तैयारी क्या है, और क्या उम्मीद करें।

इस प्रक्रिया के बारे में

जब **स्तंभन दोष (ED)** गोलियों, vacuum device या injections से ठीक नहीं होता, तो implant सबसे भरोसेमंद अगला कदम है। मैलिएबल implant सबसे सरल प्रकार है — दो soft-coated, मोड़ने योग्य छड़ें लिंग के अंदर लगाई जाती हैं। यह हमेशा संभोग के लिए पर्याप्त मज़बूत रहता है, और आप इसे हाथ से स्थिति देते हैं:

- संभोग के लिए **ऊपर** मोड़ें
- कपड़ों में छुपाने के लिए **नीचे** मोड़ें

इसमें कोई pump, reservoir या fluid नहीं है, इसलिए यह **सबसे सरल और सबसे टिकाऊ** implant है — यदि pump चलाना मुश्किल हो (जैसे हाथ में ताकत कम हो) तो यह अच्छा विकल्प है।

ज़रूरी जानकारी

सभी लिंग प्रत्यारोपणों की तरह, यह एक **स्थायी निर्णय** है: इसे लगाने के बाद स्वाभाविक स्तंभन और अन्य ED इलाज (गोलियाँ, injections) काम नहीं करते। यह आपके **पेशाब, संवेदना, चरमसुख या वीर्यपात को नहीं बदलता**। inflatable type की तुलना में अंतर: लिंग हमेशा कुछ कठोर रहता है, इसलिए छुपाना थोड़ा कठिन हो सकता है — लेकिन यह सरल और अधिक टिकाऊ है।

शब्दों को समझें

स्तंभन दोष (ED)

संभोग के लिए पर्याप्त स्तंभन न होना।

लिंग प्रत्यारोपण (Penile implant)

लिंग में लगाया जाने वाला उपकरण, जब अन्य इलाज काम न करें।

Malleable / Semi-rigid

मोड़ने योग्य implant जो लिंग को कठोर रखता है; कोई pump नहीं।

Inflatable implant

दूसरा मुख्य प्रकार — pump से फुलाया-पिचकाया जाता है; अधिक स्वाभाविक पर अधिक पुर्जे।

Concealment

लिंग को नीचे मोड़ना ताकि कपड़ों में दिखे नहीं।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको सुलाए रखती है।

टिकाऊ (Durable)

लंबे समय तक चलने वाला — fluid के पुर्जे न होने से खराबी की संभावना कम।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया या spinal anesthesia में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में 1-2 हफ्तों तक लिंग और अंडकोष में दर्द, सूजन और नील पड़ सकते हैं — scrotal support, बर्फ और दर्द की दवा से राहत मिलती है। सर्जरी आमतौर पर एक घंटे से कम की होती है और उसी दिन घर जा सकते हैं। जब तक सर्जन अनुमति न दें, implant का उपयोग संभोग के लिए न करें।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- यह **जनरल एनेस्थीसिया या spinal anesthesia** में होती है — सर्जरी के सभी निर्देश मानें (खाली पेट रहना, blood thinners सहित कुछ दवाएँ बंद करना)।
- **संक्रमण रोकना बहुत ज़रूरी है:** कोई भी संक्रमण (पेशाब का भी) पहले ठीक होना चाहिए; antiseptic soap से नहाएँगे और antibiotics दिए जाएंगे।
- **धूम्रपान या vaping न करें;** यदि **diabetes** है तो blood sugar नियंत्रित रखें — दोनों से संक्रमण का खतरा कम होता है।

पहले से अपनी टीम को बताएँ यदि आपको:

- **Diabetes** हो, या घाव भरने को प्रभावित करने वाली कोई बीमारी हो
- पहले पेल्विक या लिंग की सर्जरी, radiation, या पुराना implant हो चुका हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए या कमर से नीचे सुन्न रहते हैं; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 एक छोटे चीरे से सर्जन **लिंग के दोनों chambers में एक-एक bendable rod** डालते हैं। कोई pump या reservoir नहीं।
- 3 चीरा बंद किया जाता है और लिंग को नीचे की स्थिति में रखा जाता है। थोड़े समय के लिए catheter लग सकता है।

बाद में

- 1-2 हफ्तों तक लिंग और अंडकोष में **सूजन और नील** रह सकते हैं। scrotal support पहनें, बर्फ लगाएँ, दर्द की दवा लें और चीरे को साफ व सूखा रखें।
- **जब तक सर्जन अनुमति न दें, संभोग के लिए उपयोग न करें** — आमतौर पर **4-6 हफ्ते** बाद, जब घाव पूरी तरह भर जाए।
- ठीक होने के बाद **कोई pump सीखना नहीं है** — बस लिंग को ऊपर मोड़ें और नीचे। आपकी टीम दिखाएगी।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या चीरे पर बढ़ती लालिमा, दर्द, सूजन या रिसाव
- पेशाब न हो पाना
- तीव्र या बढ़ता दर्द, या लिंग का रंग काला-नीला पड़ना

याद रखने योग्य तीन बातें

1. मैलिएबल implant लिंग में दो bendable rods हैं — संभोग के लिए ऊपर, छुपाने के लिए नीचे मोड़ें। कोई pump नहीं; यह सबसे सरल और टिकाऊ है।
2. यह एक **स्थायी निर्णय** है (बाद में स्वाभाविक स्तंभन और गोलियाँ/injections काम नहीं करते), लेकिन यह **पेशाब, संवेदना, चरमसुख या वीर्यपात नहीं बदलता**।
3. संक्रमण रोकना सबसे ज़रूरी है: पहले कोई भी संक्रमण ठीक करें, धूम्रपान न करें, diabetes नियंत्रित रखें। सर्जन की अनुमति तक (~4-6 हफ्ते) उपयोग न करें।