

Optilume ड्रग-कोटेड बैलून

रोगी जानकारी • मूत्रमार्ग संकुचन के लिए बैलून और दवा से उपचार

WARWIKI

Optilume मूत्रमार्ग संकुचन (stricture) के लिए एक कम-चीरफाड़ वाला उपचार है — मूत्रमार्ग वह नली है जिससे पेशाब शरीर से बाहर आता है। एक विशेष बैलून संकरी जगह को धीरे से चौड़ा करता है और साथ ही दीवार में दवा छोड़ता है ताकि वह दोबारा बंद न हो। कोई चीरा या बाहरी कट नहीं लगता।

इस प्रक्रिया के बारे में

मूत्रमार्ग संकुचन (stricture) एक निशानयुक्त, संकरा हिस्सा है जो पेशाब की धारा को धीमा करता है। केवल खींचने या काटने से अक्सर यह फिर संकरा हो जाता है।

Optilume एक साथ दो काम करता है:

- **बैलून** निशानवाले हिस्से को **चौड़ा** करता है।
- बैलून पर लगी **दवा (paclitaxel)** ऊतक में पहुँचती है और निशान को दोबारा बनने से रोकती है।

यह उन चुनिंदा **बार-बार होने वाले strictures** के लिए अच्छा विकल्प है जो bulbar urethra (अंडकोष के नीचे) में हों, **लगभग 3 cm से छोटे** हों, और पहले stretching या incision के बाद वापस आ गए हों। यह सादे dilation से अधिक टिकाऊ है, लेकिन यह **urethroplasty** (खुली मरम्मत) जितना दीर्घकालिक नहीं है। आपके सर्जन आपको बताएँगे कि यह आपके लिए उचित है या नहीं।

क्या यह सुरक्षित है?

Optilume कम-चीरफाड़ वाली प्रक्रिया है जो मूत्रमार्ग के रास्ते की जाती है और अक्सर उसी दिन घर जाया जा सकता है। यह आमतौर पर सहन करने योग्य होती है। दवा की मात्रा कम है और स्थानीय रहती है। जोखिमों में पेशाब या वीर्य में खून, हल्की जलन, पेशाब में संक्रमण (UTI), और समय के साथ संकुचन का फिर आना शामिल हैं।

शब्दों को समझें

मूत्रमार्ग (Urethra)

वह नली जिससे पेशाब शरीर से बाहर आता है।

Stricture

मूत्रमार्ग में निशानयुक्त, संकरी जगह जो पेशाब की धारा को धीमा करती है।

Bulbar urethra

अंडकोष के नीचे का मूत्रमार्ग का हिस्सा, जहाँ यह उपचार सबसे अच्छा काम करता है।

ड्रग-कोटेड बैलून

एक बैलून जो संकुचन को चौड़ा करता है और दीवार में दवा पहुँचाता है।

Paclitaxel

बैलून पर लगी दवा जो निशान को दोबारा बनने से रोकती है।

Dilation

संकुचन को चौड़ा करना — यहाँ बैलून से किया जाता है।

Cystoscope

एक पतला camera जो संकुचन को देखने और जाँचने के लिए उपयोग होता है।

Catheter

प्रक्रिया के बाद थोड़ी देर के लिए मूत्रमार्ग में रखी जाने वाली नरम नली।

क्या इसमें दर्द होगा? प्रक्रिया एनेस्थीसिया या sedation में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में कुछ दिनों तक हल्की जलन, पेशाब या वीर्य में थोड़ा खून, और पेट या लिंग में हल्का दर्द हो सकता है। Catheter थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। यह एक छोटी प्रक्रिया है; अक्सर उसी दिन घर जाया जा सकता है।

तैयारी कैसे करें (प्रक्रिया से पहले)

- एनेस्थीसिया या sedation के निर्देशों का पालन करें (**खाना-पीना बंद रखना** और कौन-सी दवाएँ रोकनी हैं, जिनमें blood thinners भी शामिल हैं)।
- **पेशाब की जाँच (urine test)** से संक्रमण देखा जाता है — संक्रमण हो तो पहले उसका इलाज ज़रूरी है।
- **घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ** और थोड़े समय के लिए catheter की तैयारी रखें।

अपनी चिकित्सा टीम को पहले ही बताएँ यदि आप:

- **blood thinner** लेते हैं, या अभी पेशाब में संक्रमण है
- **बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं** — दवा के कारण आपको team द्वारा बताई गई अवधि तक condom उपयोग करने और गर्भधारण से बचने को कहा जाएगा

प्रक्रिया के दौरान क्या होता है

- 1 आप सोए हुए या sedated होते हैं; cystoscope से संकुचन की लंबाई और स्थान की जाँच होती है।
- 2 संकुचन के पार एक पतला wire डाला जाता है और बैलून फिट करने के लिए जगह को थोड़ा पहले से चौड़ा किया जाता है।
- 3 ड्रग-कोटेड बैलून को निशान के बीच रखकर निर्धारित समय के लिए फुलाया जाता है, जिससे दवा पहुँचती है।
- 4 बैलून और scope निकाले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए catheter रखा जाता है।

बाद में

- Catheter **थोड़े समय बाद** निकाला जाता है; आपकी team बताएगी कब।
- कुछ दिनों तक **हल्की जलन और हल्का गुलाबी पेशाब या वीर्य** सामान्य है। अधिक पानी पीने से मदद मिलती है।
- थोड़े समय के लिए **भारी काम न करें** और flow या लक्षण की follow-up जाँच कराएँ।
- दवा के कारण team द्वारा बताई गई अवधि तक **condom उपयोग करें**।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- **पेशाब न आए**, विशेषकर catheter निकलने के बाद
- अधिक रक्तस्राव, या पेशाब में खून के थक्के
- दर्द जो ठीक होने की बजाय बढ़ता जाए

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Optilume बैलून से मूत्रमार्ग संकुचन को चौड़ा करता है और दवा से इसे दोबारा बंद होने से रोकता है — यह एक endoscopic विकल्प है, open urethroplasty का विकल्प नहीं।
2. तैयारी के लिए: खाना-पीना बंद रखें, दवाओं के निर्देश मानें, कोई संक्रमण हो तो पहले ठीक कराएँ, घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ, और बच्चे की योजना हो तो team को बताएँ।
3. कुछ दिनों तक हल्की जलन और थोड़ा खून सामान्य है। बताई गई अवधि तक condom उपयोग करें और बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब न आए तो तुरंत call करें।