

Peyronie's disease में लिंग के अंदर एक निशान (plaque) बन जाता है जो स्तंभन (erection) के दौरान लिंग को मोड़ देता है और संभोग मुश्किल कर सकता है। **Penile plication** में लिंग के लंबे हिस्से पर टाँके लगाकर उसे छोटे हिस्से के बराबर किया जाता है, जिससे मोड़ सीधा हो जाता है। इस handout में बताया गया है कि यह कैसे काम करता है, तैयारी कैसे करें, और क्या उम्मीद करें।

इस प्रक्रिया के बारे में

Peyronie's disease में निशान का ऊतक लिंग के एक हिस्से को खींचता है, जिससे erection में मोड़ आता है। Plication में **लंबे (बाहरी) हिस्से** पर टाँके लगाकर उसे छोटा किया जाता है ताकि दोनों हिस्से बराबर हो जाएँ। कोई निशान नहीं काटा जाता, कोई graft नहीं लगाया जाता — यह सबसे सरल और सबसे छोटी सीधा करने वाली सर्जरी है, जिसमें **नए erection की समस्या का जोखिम सबसे कम** है।

यह एक अच्छा विकल्प है जब:

- आपका मोड़ मध्यम हो और बहुत जटिल न हो
- आपका **erection अच्छा हो** (गोलियों की मदद से या बिना)
- आपका लिंग इतना लंबा हो कि थोड़ा छोटा होना स्वीकार्य हो

ज़रूरी बातें

मुख्य trade-off लिंग का **थोड़ा छोटा होना** है — आमतौर पर लगभग 1–2 cm। बहुत से पुरुष इसे ज़्यादा आँकते हैं; क्योंकि मोड़ ठीक हो जाता है, इस्तेमाल होने वाली सीधी लंबाई प्रायः पहले जितनी ही रहती है। लगभग **10 में से 9** पुरुषों को संभोग के लिए पर्याप्त सीधा erection मिलता है। आप त्वचा के नीचे **टाँके महसूस** कर सकते हैं (यह सामान्य है और आमतौर पर परेशानी नहीं देता)। लक्ष्य आरामदायक संभोग के लिए पर्याप्त सीधा लिंग है, हमेशा बिल्कुल सीधा नहीं।

शब्दों को समझें

Peyronie's disease

लिंग में एक निशान जो erection के दौरान उसे मोड़ देता है।

Plaque

निशान के ऊतक का वह हिस्सा जो मोड़ का कारण बनता है।

Plication

लंबे हिस्से पर टाँके लगाकर लिंग को सीधा करना।

Artificial erection

ऑपरेशन के दौरान injection से बनाया गया erection, जिससे सर्जन मोड़ माप और जाँच सकें।

Circumcision

चमड़ी हटाना — कभी-कभी उसी समय किया जाता है यदि पहले नहीं हुआ।

Vacuum device

एक pump जो कभी-कभी ठीक होने के दौरान लंबाई और erection बनाए रखने में मदद करता है।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको सुला देती है और दर्द नहीं होने देती।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल, spinal, या लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में 1-2 हफ्ते तक लिंग में सूजन, नीलापन, और दर्द रह सकता है — बर्फ, सहारा देने वाला अंडरवियर, और दर्द की दवा मदद करती है। यह एक छोटी सर्जरी है (अक्सर लगभग एक घंटा) और आमतौर पर उसी दिन घर जाते हैं। कुछ समय के लिए catheter लग सकता है।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल, spinal, या लोकल एनेस्थीसिया** में की जाती है — सभी सर्जरी निर्देश मानें (खाली पेट रहना, और कौन-सी दवाएँ, जैसे blood thinners, बंद करनी हैं)।
- आपकी Peyronie's **स्थिर** होनी चाहिए (कई महीनों से मोड़ और दर्द में कोई बदलाव नहीं) — सर्जन सही समय की पुष्टि करेंगे।
- **धूम्रपान न करें**; कोई भी संक्रमण पहले ठीक किया जाएगा, और antibiotics दी जाएँगी। यदि circumcision नहीं हुई, तो उसी समय हो सकती है — सर्जन से पूछें।

अपनी चिकित्सा टीम को पहले से बताएँ यदि:

- आपका **erection कमज़ोर** हो या आप erection की दवा लेते हों
- आप blood thinner लेते हों, या पहले लिंग की सर्जरी हो चुकी हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए या सुन्न होते हैं, और antibiotics दी जाती हैं।
- 2 **Injection से artificial erection बनाई जाती है** ताकि सर्जन मोड़ देख सकें, फिर लंबे हिस्से पर टाँके लगाकर लिंग को सीधा किया जाता है।
- 3 दूसरी erection से परिणाम जाँचा जाता है और त्वचा बंद की जाती है (यदि ज़रूरी हो तो circumcision भी की जाती है)।

बाद में

- 1-2 हफ्ते तक **सूजन, नीलापन, और दर्द** की उम्मीद करें। बर्फ, सहारा देने वाला अंडरवियर, और दर्द की दवा लें; साफ रखें।
- यदि catheter लगा हो, तो आमतौर पर सर्जरी के अगले दिन सुबह निकाल दिया जाता है।
- ठीक होने के लिए **लगभग 4-6 हफ्ते तक संभोग से बचें**।
- आपकी टीम ठीक होने के दौरान लंबाई और erection बनाए रखने के लिए **कम खुराक की erection गोली** और/या **vacuum device** के उपयोग की सलाह दे सकती है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या घाव पर बढ़ती लालिमा, दर्द, सूजन, या रिसाव
- पेशाब न कर पाना
- तेज़ या बढ़ती सूजन या दर्द, या अधिक रक्तस्राव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. Plication लिंग के लंबे हिस्से पर टाँके लगाकर मोड़ ठीक करता है — कोई निशान नहीं काटा जाता, कोई graft नहीं लगता। यह सबसे सरल सर्जरी है जिसमें न erection की समस्या का जोखिम सबसे कम है।
2. Trade-off है थोड़ा **छोटा होना** (आमतौर पर 1-2 cm), हालाँकि मोड़ ठीक होने से प्रायः उपयोगी लंबाई वापस मिल जाती है; ~10 में से 9 पुरुषों को पर्याप्त सीधा erection मिलता है।
3. Peyronie's पहले स्थिर होनी चाहिए; धूम्रपान न करें। बाद में ~4-6 हफ्ते संभोग से बचें और healing plan (गोली/vacuum device) अपनाएँ। बुखार, तेज़ सूजन, या पेशाब में दिक्कत पर तुरंत call करें।