

पेरिनियल यूरेथ्रोस्टॉमी

रोगी जानकारी · पेरिनियम में पेशाब के लिए एक नया, स्थायी छिद्र

WARWIKI

पेरिनियल यूरेथ्रोस्टॉमी में पेरिनियम — अंडकोष और गुदा के बीच का क्षेत्र — में पेशाब के लिए एक नया, स्थायी छिद्र बनाया जाता है। यह तब की जाती है जब मूत्रमार्ग (urethra) बहुत संकरा, निशानदार, या क्षतिग्रस्त हो। इसके बाद आप लिंग की नोक की बजाय इस छिद्र से बैठकर पेशाब करते हैं। यह पुस्तिका बताती है कि यह कैसे काम करती है, तैयारी कैसे करें, और क्या उम्मीद करें।

इस प्रक्रिया के बारे में

Stricture मूत्रमार्ग (urethra) का एक निशानदार, संकरा हिस्सा है जो पेशाब के प्रवाह को रोकता है। जब संकुचन लंबा हो, बार-बार लौटता हो, या मूत्रमार्ग दोबारा बनाने लायक न हो, तो सर्जन संकुचन के पीछे के **स्वस्थ मूत्रमार्ग** को पेरिनियम की त्वचा तक लाकर टाँकों से खुला रखता है। पेशाब वहीं से निकलता है।

यह एक **विश्वसनीय, टिकाऊ** समाधान है जो लंबे या बार-बार की सर्जरी से बचाता है — जटिल strictures के लिए या जब आप कई ऑपरेशन नहीं चाहते।

क्या जानना ज़रूरी है

मुख्य बदलाव यह है कि आप नए छिद्र से **बैठकर पेशाब** करेंगे; पेशाब अब लिंग की नोक से नहीं निकलेगा। अधिकतर पुरुष इसके साथ आसानी से ढल जाते हैं। आपका **लिंग यथावत रहता है** — अनुभूति और चरमोत्कर्ष (orgasm) आमतौर पर अपरिवर्तित रहते हैं, और अधिकांश पुरुष अपना स्तंभन (erection) बनाए रखते हैं (कुछ को बदलाव हो सकता है)। समय के साथ छिद्र **संकरा** हो सकता है; ऐसा होने पर एक छोटी प्रक्रिया से उसे फिर खोला जा सकता है।

शब्दों को समझें

Urethra (मूत्रमार्ग)

वह नली जो शरीर से पेशाब बाहर ले जाती है।

Stricture

मूत्रमार्ग का निशानदार, संकरा हिस्सा जो पेशाब को रोकता है।

पेरिनियम

अंडकोष और गुदा के बीच का क्षेत्र, जहाँ नया छिद्र बनाया जाता है।

पेरिनियल यूरेथ्रोस्टॉमी

वह ऑपरेशन जो पेरिनियम में एक नया, स्थायी छिद्र बनाता है।

Stoma

वह नया छिद्र जहाँ से पेशाब निकलता है।

Stomal संकुचन

नए छिद्र का समय के साथ तंग होना — आमतौर पर छोटी प्रक्रिया से ठीक होता है।

Catheter

एक मुलायम नली जो छिद्र के ठीक होने तक 1–2 हफ्ते रखी जाती है।

जनरल एनेस्थीसिया

दवा जो सर्जरी के दौरान आपको सुलाए और दर्दमुक्त रखती है।

क्या इसमें दर्द होगा? सर्जरी जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए उस दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में 1-2 हफ्ते पेरिनियम में सूजन, नीलापन, और दर्द रह सकता है — गर्म सिट्ज़ बाथ, बर्फ, और दर्द की दवा से आराम मिलता है। सर्जरी में catheter लगाया जाता है। अधिकांश लोग उसी दिन या एक रात बाद घर जाते हैं।

तैयारी कैसे करें (सर्जरी से पहले)

- **जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया** दी जाती है — सभी निर्देश मानें (खाली पेट रहना, और कौन-सी दवाएँ, जैसे blood thinners, बंद करनी हैं)।
- **पेशाब का test** संक्रमण जाँचता है (पहले इलाज होगा); antibiotics मिलेंगे। **धूम्रपान न करें** — यह ठीक होने में देरी करता है।
- सर्जरी में पैर stirrups में रखे जाते हैं। **लगभग 1-2 हफ्ते catheter** रहेगा; घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ।

अपनी टीम को पहले बताएँ यदि:

- आपको **पेल्विक radiation** हुई हो — नया छिद्र संकरा होने की संभावना अधिक है
- आप blood thinner लेते हों, या वर्तमान में कोई संक्रमण हो

सर्जरी के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए या सुन्न रहते हैं, पैर सहारे पर होते हैं; antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 पेरिनियम में चीरे से सर्जन stricture के पीछे स्वस्थ मूत्रमार्ग तक पहुँचता है और निशानदार हिस्सा हटाता या बायपास करता है।
- 3 स्वस्थ मूत्रमार्ग को त्वचा तक लाकर चौड़ा छिद्र बनाया जाता है; catheter लगाकर घाव बंद किया जाता है।

बाद में

- 1-2 हफ्ते **सूजन, नीलापन, और दर्द** रह सकता है। गर्म सिट्ज़ बाथ, बर्फ, और दर्द की दवा लें; क्षेत्र साफ रखें।
- **Catheter लगभग 1-2 हफ्ते** रहता है, फिर टीम निकालती है। उसके बाद आप नए छिद्र से **बैठकर पेशाब** करेंगे।
- कई हफ्तों तक **भारी उठाने, जोर लगाने, cycling, और यौन संबंध** से बचें; सीधे उस क्षेत्र पर बैठने से भी बचें।
- यदि समय के साथ **धार कमज़ोर** हो, तो छिद्र संकरा हो सकता है — टीम को बताएँ; छोटी प्रक्रिया से ठीक होता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- Catheter निकल जाए या बंद हो जाए, या निकालने के बाद **पेशाब न आए**
- बुखार या ठंड लगना, या घाव पर बढ़ती लालिमा, दर्द, सूजन, या रिसाव
- अत्यधिक रक्तस्राव

याद रखने योग्य तीन बातें

1. पेरिनियल यूरेथ्रोस्टॉमी पेरिनियम में पेशाब के लिए एक स्थायी छिद्र बनाती है — जब मूत्रमार्ग बहुत संकरा या क्षतिग्रस्त हो। बाद में आप **बैठकर पेशाब** करेंगे।
2. यह टिकाऊ और विश्वसनीय है और बार-बार की सर्जरी से बचाती है। आपका **लिंग यथावत रहता है**; अनुभूति और orgasm प्रायः अपरिवर्तित रहते हैं।
3. लगभग 1-2 हफ्ते catheter रहता है। छिद्र संकरा हो सकता है — धार कमज़ोर हो तो बताएँ। बुखार, अधिक रक्तस्राव, या पेशाब न आने पर तुरंत संपर्क करें।