

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы (Таблетки для уменьшения простаты)

WARWIKI

Информация для пациента · Таблетки, постепенно уменьшающие увеличенную простату

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы — это таблетки, которые **медленно уменьшают увеличенную простату (BPH)**, улучшают мочеиспускание и снижают риск задержки мочи и операции на простате. Препараты класса: **финастерид (Proscar)** и **дутастерид (Avodart)**. Они действуют постепенно — для полного эффекта требуется несколько месяцев.

Как это действует

Таблетки блокируют превращение тестостерона в **DHT** — гормон, стимулирующий рост простаты. При меньшем количестве DHT простата **постепенно уменьшается**, расширяя мочевой канал. Полный эффект наступает через **3–6 месяцев** — это не быстродействующее средство; его нередко сочетают с альфа-блокатором для быстрого облегчения симптомов.

Чего ожидать

- Наиболее эффективны при **значительно увеличенной** простате; эффект нарастает постепенно.
- Принимают **один раз в день**, длительно.
- Со временем снижают риск **задержки мочи** и необходимости операции.

ТЕРМИНЫ

5-ARI

Ингибитор 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид).

BPH

Доброкачественная гиперплазия простаты — увеличение простаты.

DHT

Гормон, стимулирующий рост простаты; эти таблетки снижают его уровень.

PSA

Анализ крови на антиген простаты; препараты примерно вдвое снижают его значение.

Задержка мочи

Невозможность опорожнить мочевого пузыря — риск снижается со временем.

Финастерид / дутастерид

Два препарата этого класса.

ВЛИЯНИЕ НА АНАЛИЗ PSA Эти таблетки снижают уровень **PSA примерно вдвое**. Это не опасно, но врач должен знать об этом для правильной интерпретации скрининга рака простаты — как правило, ваш результат PSA **удваивают** для сравнения с нормой. Обязательно сообщайте каждому специалисту, что вы принимаете этот препарат.

Как принимать

- **Один раз в день**, в одно и то же время; будьте терпеливы — эффект наступает через месяцы.
- Не прекращайте приём из-за отсутствия быстрого результата.
- Как правило, препарат принимают длительно, чтобы сохранить уменьшение простаты.

Важная безопасность

- **Беременным женщинам нельзя брать в руки** раздробленные или сломанные таблетки (риск для плода мужского пола); целая таблетка в оболочке безопасна.
- **Не сдавайте кровь** во время приёма и в течение определённого срока после его отмены.
- Сообщайте врачу о **перепадах настроения или депрессии**, которые отмечались на фоне приёма.

Частые побочные эффекты

- Снижение полового влечения, затруднение эрекции или уменьшение объёма эякулята
- Болезненность или увеличение молочных желёз
- У некоторых мужчин сексуальные нарушения сохраняются — обсудите любые опасения с врачом

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Уплотнение в груди**, боль или выделения из соска
- Новая **депрессия** или перепады настроения
- Невозможность помочиться (обратитесь за неотложной помощью)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Ингибиторы 5-ARI постепенно уменьшают простату, улучшая мочеиспускание и снижая риск задержки мочи и операции — дайте им 3–6 месяцев.
2. Они **снижают PSA примерно вдвое** — убедитесь, что врач учитывает это при скрининге рака простаты.
3. Беременным женщинам нельзя брать сломанные таблетки; не сдавайте кровь во время приёма. Сообщайте об изменениях в молочных железах или новой депрессии.