

# Альфа-блокаторы (для простаты / мочеиспускания)

Информация для пациента · Таблетки, расслабляющие мочевой канал для улучшения тока мочи

WARWIKI

Альфа-блокаторы — таблетки, которые **расслабляют мышцу** простаты и шейки мочевого пузыря, облегчая мочеиспускание. Это стандартное первое лекарство при симптомах **доброкачественной гиперплазии простаты (BPH)**. Распространённые препараты: **tamsulosin (Flomax), alfuzosin, silodosin, doxazosin и terazosin**. Они действуют быстро, но не уменьшают простату.

## Как это действует

Увеличенная простата сдавливает мочеиспускательный канал. Альфа-блокаторы **расслабляют мышцу у шейки мочевого пузыря**, усиливая струю и уменьшая затруднённое, прерывистое мочеиспускание. Они устраняют **симптомы** — размер простаты не меняется, поэтому эффект сохраняется только на фоне приёма.

## Чего ожидать

- Улучшение обычно наступает **быстро** — в течение нескольких дней или недель.
- Как правило принимают **один раз в день**; tamsulosin — примерно **через 30 минут после одного и того же приёма пищи**.
- Doxazosin/terazosin начинают принимать **на ночь**, постепенно повышая дозу для снижения риска головокружения.
- При значительном увеличении простаты можно сочетать с препаратом, уменьшающим её объём.

## ТЕРМИНЫ

### Альфа-блокатор

Таблетка, расслабляющая мышцу у шейки мочевого пузыря.

### BPH

Доброкачественная гиперплазия простаты — увеличенная простата.

### Шейка мочевого пузыря

Мышечное отверстие, где мочевой пузырь переходит в уретру.

### Ретроградная эякуляция

Семя попадает обратно в мочевой пузырь — безвредно, но количество выделяемого уменьшается или оно отсутствует.

### Ортостатическая гипотензия

Головокружение при резком вставании из-за падения давления.

### IFIS

Синдром «вялой радужки» при операции на катаракте — сообщите об этом хирургу-офтальмологу.

**ПЛАНИРУЕТСЯ ОПЕРАЦИЯ НА КАТАРАКТЕ?** Сообщите хирургу-офтальмологу, что вы принимаете (или принимали) альфа-блокатор — это может вызвать синдром «вялой радужки» (IFIS) во время операции, и врач учтёт это при подготовке. Важно сообщить **даже если вы уже прекратили** приём препарата.

## Как принимать

- Принимайте **в одно и то же время ежедневно** по назначению (tamsulosin — через ~30 мин после еды).
- С doxazosin/terazosin — **первую дозу принимайте на ночь** и вставайте медленно: первый приём может снизить давление и вызвать головокружение.
- Если пропустили дозу, не удваивайте следующую.

## Важная безопасность

- Вставайте **медленно**, особенно поначалу, чтобы избежать головокружения или обморока.
- С осторожностью сочетайте с **ингибиторами PDE5** или препаратами от давления (усиление головокружения).
- **Ретроградная эякуляция** (скудное или «сухое» семяизвержение) часто встречается при tamsulosin/silodosin — безвредна и обратима при отмене.

## Частые побочные эффекты

- Головокружение; усталость
- Заложенность носа
- Скудное или «сухое» семяизвержение

### Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Обморок** или сильное головокружение
- Учащённое сердцебиение или боль в груди
- **Полная задержка мочи** (срочно обратитесь за помощью)

## ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Альфа-блокаторы быстро расслабляют шейку мочевого пузыря при БРП — устраняют симптомы, но не уменьшают простату.
2. Первое время вставайте медленно (головокружение); скудное семяизвержение — обычное и безвредное явление.
3. Обязательно сообщайте **хирургу-офтальмологу** перед операцией на катаракте о приёме альфа-блокаторов.