

Амбулаторная уродинамика (без катетера)

Информация для пациента · Беспроводное исследование мочевого пузыря в течение обычного дня

WARWIKI

Это современный метод исследования функции мочевого пузыря без катетера. Небольшой беспроводной датчик помещается в мочевой пузырь и измеряет давление, пока вы пьёте и двигаетесь в обычном режиме — результаты отражают реальную работу пузыря, а не короткий сеанс в клинике.

Об этом исследовании

Стандартное уродинамическое исследование (UDS) требует трубок и заполнения пузыря жидкостью в клинике. Это исследование устроено иначе:

- Небольшой мягкий **кольцевидный датчик** вводится в мочевой пузырь через уретру — это занимает меньше минуты с применением обезболивающего геля.
- Вы носите небольшой **беспроводной приёмник**, который записывает показания.
- Пузырь наполняется **естественным образом по мере питья**, а мочиться можно **как обычно** с датчиком внутри.

Поскольку исследование проходит в привычных условиях, оно особенно полезно, когда стандартный тест был некомфортным или неинформативным, либо когда симптомы носят эпизодический характер. Результаты более достоверны, когда обычный катетер мешает нормальному мочеиспусканию.

Это безопасно?

Первые данные обнадеживают. Датчик спроектирован так, чтобы оставаться на месте во время мочеиспускания и не мешать струе; в начальных исследованиях серьёзных осложнений не выявлено. Риски сопоставимы с рисками кратковременной катетеризации — лёгкое жжение и небольшая вероятность инфекции мочевыводящих путей (UTI). Датчик измеряет только давление в пузыре и не заменяет все компоненты стандартного исследования.

ТЕРМИНЫ

Амбулаторный

Проводится во время обычной дневной активности, а не лёжа в клинике.

Датчик

Небольшое кольцевидное устройство в мочевом пузыре, измеряющее давление.

Беспроводной приёмник

Небольшой блок, который вы носите и который записывает показания датчика.

Без катетера

Во время исследования трубки не остаются в мочевом пузыре, в отличие от стандартной уродинамики.

Естественное наполнение

Пузырь наполняется сам по мере питья, а не через вводимую жидкость.

Мочеиспускание

Выведение мочи — происходит в обычном режиме с датчиком внутри.

Дневник мочеиспускания

Простой журнал, где вы фиксируете, когда пьёте и мочитесь; может потребоваться заполнение.

Уродинамика

Исследования, оценивающие, как мочевой пузырь накапливает и выводит мочу.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Установка датчика занимает несколько секунд с обезболивающим гелем и ощущается как кратковременное давление. Большинство пациентов почти не замечают датчик в ходе исследования и могут свободно двигаться и мочиться. Извлечение быстрое — датчик аккуратно вытягивают через уретру за тонкую нить.

Как подготовиться (до исследования)

- Особой подготовки не требуется. Приходите готовыми **пить жидкость и находиться в клинике** в течение периода мониторинга, о котором сообщит ваш врач.
- Принимайте **обычные лекарства**, но уточните, нужно ли временно отменить препараты для мочевого пузыря.
- Если попросят, **ведите простой дневник**: фиксируйте, когда пьёте и мочитесь в ходе исследования.

Сообщите врачу заранее, если у вас:

- Признаки **инфекции мочевыводящих путей** (жжение, температура, мутная или резко пахнущая моча) — активная инфекция может стать поводом для переноса исследования
- Приём антикоагулянтов или наличие аллергий

Что происходит во время исследования

- 1 Область обрабатывается и наносится обезболивающий гель.
- 2 Кольцевидный датчик аккуратно вводится в мочевого пузырь через уретру; вы надеваете беспроводной приёмник.
- 3 Вы пьёте жидкость и ведёте обычный образ жизни, пока датчик записывает данные; мочитесь по мере позывов в обычном режиме.
- 4 По окончании периода мониторинга датчик аккуратно извлекается через уретру за нить.

После исследования

- Можно сразу **вернуться к обычной деятельности**.
- Возможно **лёгкое жжение при мочеиспускании** в течение суток. Помогает обильное питьё воды.
- В моче может появиться **розоватый оттенок** на короткое время. Это нормально и обычно проходит в течение дня.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Затруднённое мочеиспускание или полная его невозможность
- Обильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Боль, которая усиливается, а не проходит

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Это беспроводное исследование мочевого пузыря без катетера — небольшой датчик фиксирует работу пузыря в течение обычного дня.
2. Подготовка минимальна: придите готовыми пить жидкость и находиться под наблюдением, ведите дневник при необходимости, сообщите о признаках инфекции заранее.
3. Установка и извлечение занимают секунды, после чего вы сразу идёте домой. Лёгкое жжение или розоватая моча в течение дня — норма; при температуре, обильном кровотечении или нарушении мочеиспускания обратитесь к врачу.