

Anticholinergics (при гиперактивном мочевом пузыре)

Информация для пациента · Таблетки, снижающие преждевременные сокращения мочевого пузыря

WARWIKI

Антихолинергические препараты (также называемые антимускариниками) успокаивают **гиперактивный мочевой пузырь (OAB)**, уменьшая внезапные позывы, частые походы в туалет и ургентное недержание. Распространённые препараты: **oxybutynin, tolterodine, solifenacin, fesoterodine, darifenacin и trospium** (oxybutynin также выпускается в виде пластыря или геля). Это проверенный и эффективный вариант лечения.

Как это действует

Препараты **блокируют сигналы**, вызывающие сокращение мышцы мочевого пузыря, поэтому он сокращается реже и менее внезапно при наполнении. Это снижает позывы и учащённое мочеиспускание. Эффект сохраняется, пока вы принимаете препарат; заметное улучшение наступает в течение нескольких недель.

Чего ожидать

- Улучшение обычно наступает через **несколько недель** — не торопитесь с выводами.
- Большинство форм с пролонгированным высвобождением принимают **один раз в день**.
- **Таблетки с пролонгированным высвобождением, пластырь или гель** вызывают меньше сухости во рту, чем oxybutynin короткого действия.

ТЕРМИНЫ

Гиперактивный мочевой пузырь (OAB)

Позывы и учащённое мочеиспускание из-за преждевременных сокращений мочевого пузыря.

Anticholinergic / antimuscarinic

Класс препаратов, успокаивающих мышцу мочевого пузыря.

Сухость во рту

Наиболее частый побочный эффект.

Антихолинергическая нагрузка

Суммарный эффект нескольких таких препаратов — важно учитывать у пожилых.

Бета-3-агонист

Другой препарат от OAB с меньшим числом подобных эффектов (альтернатива).

Закротоугольная глаукома

Заболевание глаз, при котором эти препараты обычно противопоказаны.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ У пожилых эти препараты могут влиять на **память и мышление**, а длительный приём нескольких антихолинергических средств связан с когнитивными нарушениями. Если это вас беспокоит, спросите врача о **бета-3-агонисте** — альтернативном препарате от ОАВ без такого эффекта.

Как принимать

- Принимайте **один раз в день** по назначению; не прекращайте приём досрочно, если позывы ещё не прошли.
- Если сухость во рту беспокоит, спросите о **форме с пролонгированным высвобождением, пластыре или геле**.
- Для лучшего результата сочетайте с тренировкой мочевого пузыря и упражнениями для тазового дна (Кегеля).

Важная безопасность

- Как правило **противопоказаны при нелечённой закрытоугольной глаукоме** — сообщите врачу о болезнях глаз.
- Соблюдайте осторожность при **затруднённом опорожнении мочевого пузыря**, выраженном запоре или некоторых заболеваниях желудка.
- Препараты снижают потоотделение — в **жаркую погоду** следите за перегревом.

Частые побочные эффекты

- **Сухость во рту и запор** (наиболее часто)
- Нечёткость зрения, сухость глаз
- Сонливость; у пожилых — спутанность сознания

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Вы **не можете помочиться** или чувствуете неполное опорожнение
- **Новые нарушения памяти или спутанность сознания**, особенно в пожилом возрасте
- Сильный запор или **боль/покраснение глаз с нарушением зрения**

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Антихолинергические препараты успокаивают гиперактивный мочевой пузырь, уменьшая позывы, учащённое мочеиспускание и ургентное недержание; дайте им несколько недель.
2. Сухость во рту и запор — частые эффекты; форма с пролонгированным высвобождением, пластырь или гель переносятся лучше.
3. У пожилых возможно влияние на мышление; бета-3-агонист — альтернатива. Обратитесь к врачу, если не можете помочиться или появилась спутанность сознания.