

Chụp niệu đạo ngược dòng (RUG)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Những điều cần biết trước khi chụp X-quang niệu đạo

Chụp niệu đạo ngược dòng — hay còn gọi là “RUG” — là xét nghiệm X-quang ngắn chụp hình ảnh niệu đạo, ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể. Một lượng nhỏ thuốc cản quang được đưa nhẹ nhàng vào niệu đạo để hiển thị rõ trên X-quang. Điều này giúp bác sĩ phẫu thuật tìm và đo bất kỳ chỗ hẹp, sẹo hoặc tổn thương trước khi lên kế hoạch điều trị.

Về xét nghiệm này

Mô sẹo hoặc chỗ hẹp bên trong niệu đạo — gọi là **hẹp niệu đạo** — có thể khó nhìn thấy trên hình chụp thông thường. RUG bơm thuốc cản quang đặc biệt vào ống, hiện lên màu trắng trên X-quang, tạo ra “bản đồ” rõ ràng về bên trong niệu đạo của bạn.

Bác sĩ có thể chỉ định RUG để:

- Tìm chỗ hẹp hoặc sẹo và xác định chính xác vị trí, chiều dài của chúng
- Kiểm tra niệu đạo sau chấn thương
- Lên kế hoạch phẫu thuật sửa chữa niệu đạo
- Theo dõi quá trình lành thương sau phẫu thuật

Xét nghiệm cho thấy lòng ống bên trong niệu đạo — đường nước tiểu đi qua. Xét nghiệm không xem thận và không phải là điều trị; đây là hình ảnh giúp định hướng bước tiếp theo.

Có an toàn không?

Có. RUG là xét nghiệm phổ biến, ít rủi ro. Lượng tia X sử dụng rất nhỏ, và thuốc cản quang gốc nước sẽ theo nước tiểu ra ngoài cơ thể. Hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy khó chịu nhẹ và thoáng qua. Tác dụng phụ không thường gặp — như nhiễm trùng đường tiết niệu nhẹ, chảy máu ít, hoặc tiểu khó trong thời gian ngắn — thường nhẹ và tự hết nhanh.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể.

Hẹp niệu đạo

Chỗ hẹp hoặc có sẹo trong niệu đạo, có thể làm chậm hoặc tắc nghẽn dòng nước tiểu.

Thuốc cản quang

Chất lỏng hiện màu trắng trên X-quang, giúp nhìn thấy bên trong niệu đạo.

Ống thông

Ống mềm mỏng. Trong xét nghiệm này, chỉ đặt phần đầu ống vào ngay cửa niệu đạo — không đưa vào sâu bên trong.

Fluoroscopy

Loại X-quang cho thấy hình ảnh động trực tiếp khi thuốc cản quang chảy qua.

Lỗ tiểu

Lỗ mở ở đầu dương vật, nơi nước tiểu thoát ra.

Cấy nước tiểu

Xét nghiệm nhanh trên mẫu nước tiểu để kiểm tra nhiễm trùng trước khi làm xét nghiệm.

Bác sĩ tiết niệu tái tạo

Bác sĩ phẫu thuật chuyên về đường tiết niệu và sửa chữa niệu đạo.

CÓ ĐAU KHÔNG? Hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy áp lực hoặc rất nhẹ thoáng qua khi bơm thuốc, không đau nhói. Nhóm chăm sóc có thể làm chậm lại bất cứ lúc nào — hãy nói nếu bạn thấy khó chịu. Xét nghiệm hoàn thành trong khoảng 15–30 phút.

Cách chuẩn bị (Trước khi làm xét nghiệm)

Việc chuẩn bị rất đơn giản. Trong hầu hết trường hợp:

- Bạn có thể **ăn uống bình thường** — không cần nhịn ăn trừ khi nhóm chăm sóc có hướng dẫn khác.
- Uống **thuốc thường dùng** như bình thường, trừ khi nhóm chăm sóc yêu cầu ngừng.
- Thông thường bạn có thể **tự lái xe về** vì hầu hết bệnh nhân không cần an thần.

Hãy thông báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Từng có phản ứng với thuốc cản quang X-quang hoặc iốt
- Đang dùng thuốc chống đông máu
- Có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu (rất buốt, sốt, hoặc nước tiểu đục, mùi nặng) — nhiễm trùng đang hoạt động có thể khiến xét nghiệm phải dời lại

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp **mẫu nước tiểu** để kiểm tra nhiễm trùng, và có thể được cho **kháng sinh** trước hoặc sau xét nghiệm để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Quá trình xét nghiệm

- 1 Bạn nằm trên bàn X-quang, thường hơi nghiêng sang một bên. Nhóm chăm sóc giúp bạn vào tư thế phù hợp.
- 2 Đầu dương vật được làm sạch. Một ống mềm nhỏ được đặt **ngay tại cửa niệu đạo** — chỉ phần đầu ống. Một bóng nhỏ có thể được bơm nhẹ để giữ ống tại chỗ.
- 3 Thuốc cản quang được bơm chậm vào niệu đạo trong khi chụp X-quang. Bạn có thể được yêu cầu giữ yên và thở bình thường.
- 4 Nhóm chăm sóc theo dõi thuốc trên màn hình và chụp một vài hình từ các góc khác nhau. Sau đó ống được rút ra.

Sau khi xét nghiệm

- Thông thường bạn có thể về nhà và **sinh hoạt bình thường ngay**.
- Bạn có thể **rất nhẹ khi đi tiểu** trong một ngày. Uống nhiều nước giúp tống thuốc ra ngoài và giảm cảm giác khó chịu này.
- Bạn có thể thấy **một ít máu** ở đầu dương vật hoặc nước tiểu hơi hồng. Điều này thường gặp và thường hết trong vòng một ngày.
- Thuốc cản quang sẽ theo nước tiểu ra ngoài cơ thể trong vài giờ tiếp theo.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Tiểu khó, hoặc không tiểu được
- Chảy máu nhiều, hoặc máu không cầm
- Đau ngày càng nặng hơn

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. RUG là xét nghiệm X-quang nhanh, an toàn, dùng thuốc cản quang đặc biệt để lập bản đồ bên trong niệu đạo — giúp bác sĩ lên kế hoạch điều trị phù hợp.
2. Chuẩn bị rất đơn giản. Ăn uống và uống thuốc như thường — nhưng hãy báo nhóm chăm sóc nếu dị ứng thuốc cản quang, đang dùng thuốc chống đông, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu.
3. Hầu hết bệnh nhân chỉ cảm thấy áp lực nhẹ và về nhà ngay. Rất nhẹ hoặc chút máu trong một ngày là bình thường — uống nhiều nước, và gọi ngay nếu sốt, chảy máu nhiều, hoặc tiểu khó.