

Cố định mỏm âm đạo vào xương cùng (Sacrocolpopexy)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật nâng đỉnh âm đạo bền vững với lưới đỡ

Sacrocolpopexy là một trong những phương pháp sửa chữa sa tạng chậu bền vững nhất cho trường hợp sa **đỉnh âm đạo hoặc tử cung**. Một tấm lưới mềm được dùng để nâng đỉnh âm đạo và cố định vào dây chằng chắc chắn phía trên **xương cùng**, giúp khôi phục vị trí và độ sâu tự nhiên. Phẫu thuật thường được thực hiện qua đường nội soi (robot hoặc nội soi ổ bụng) và bảo tồn khả năng quan hệ tình dục.

Về ca phẫu thuật này

Một tấm **lưới** được dính vào mặt trước và mặt sau của đỉnh âm đạo, sau đó cố định vào dây chằng chắc chắn phía trên **xương cùng**. Điều này giữ âm đạo ở đúng vị trí bình thường. Đây được coi là phương pháp sửa chữa sa đỉnh âm đạo **tiêu chuẩn vàng** vì độ bền rất cao.

Về tấm lưới

Tấm lưới được đặt qua **đường bụng** và có hồ sơ an toàn được nghiên cứu kỹ. Đây là loại **khác** với lưới đặt qua đường âm đạo để sửa sa tạng chậu — loại đó đã bị FDA cảnh báo và thu hồi khỏi thị trường. Bác sĩ phẫu thuật sẽ trao đổi về các nguy cơ nhỏ, bao gồm khả năng hiếm gặp là lưới bị lộ ra ngoài.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Đỉnh / vòm âm đạo

Phần trên của âm đạo, có thể bị sa sau sinh con hoặc sau cắt tử cung.

Xương cùng

Xương ở đáy cột sống; dây chằng ở đây giữ chỗ bám cho lưới.

Lưới

Vật liệu mềm, lâu dài dùng để đỡ đỉnh âm đạo.

Robot / nội soi

Phẫu thuật qua vài vết rạch nhỏ (phẫu thuật xâm lấn tối thiểu).

Lưới bị lộ

Biến chứng không phổ biến khi một phần nhỏ lưới lộ ra; có thể điều trị được.

Cắt tử cung

Phẫu thuật lấy bỏ tử cung, đôi khi thực hiện cùng lúc.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới **gây mê toàn thân**, bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Với phẫu thuật nội soi, hầu hết bệnh nhân chỉ đau nhẹ tại các vết rạch nhỏ và khó chịu do hơi, có thể về nhà trong ngày hoặc sau một đêm. Phẫu thuật mở cần thời gian hồi phục lâu hơn một chút.

Cách chuẩn bị

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân** — tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc (ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ định).
- Khám tiền phẫu; có thể kết hợp **cắt tử cung** và/hoặc phẫu thuật điều trị tiểu không kiểm soát trong cùng một lần mổ.
- Không hút thuốc; thu xếp người đưa về và hỗ trợ tại nhà.

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê; kháng sinh được dùng trước mổ.
- 2 Qua các vết rạch nhỏ (hoặc một vết mổ mở), lưới được đính vào đỉnh âm đạo.
- 3 Lưới được cố định vào dây chằng xương cùng, nâng âm đạo về đúng vị trí.
- 4 Ống thông tiểu được đặt trong thời gian ngắn.

Sau phẫu thuật

- Về nhà trong ngày hoặc sau một đêm; vận động nhẹ nhàng ban đầu.
- **Tránh nâng vật nặng, rặn và quan hệ tình dục trong khoảng 6 tuần.**
- Ra ít máu và khó chịu nhẹ là bình thường; điều trị táo bón sớm.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Chảy máu nhiều, hoặc đau bụng/vùng chậu ngày càng tăng
- **Không thể đi tiểu**, hoặc buồn nôn/nôn kéo dài
- Khí hư âm đạo có mùi, hoặc đau khi quan hệ về sau (có thể liên quan đến lưới)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Sacrocolpopexy nâng đỉnh âm đạo bằng lưới cố định vào xương cùng — phương pháp bền vững nhất cho sa đỉnh âm đạo, thường thực hiện qua nội soi.
2. Lưới đặt qua đường bụng được nghiên cứu kỹ và khác với lưới đặt qua đường âm đạo đã bị thu hồi.
3. Tránh nâng nặng và quan hệ ~6 tuần. Gọi cho bác sĩ nếu sốt, chảy máu nhiều, không thể đi tiểu, hoặc sau này có mùi/đau bất thường.