

مثبطات 5-ألفا ريدكتيز هي حبوب تُصَغَّر البروستاتا المتضخمة (BPH) ببطء، فتحسِّن تدفق البول وتقلِّل مع الوقت من احتمال انسداد مجرى البول والحاجة إلى جراحة البروستاتا. النوعان هما فيناستيريد (Proscar) ودوتاستيريد (Avodart). تعمل تدريجياً — امنحها عدة أشهر.

كيف تعمل

تمنع هذه الحبوب تحويل الجسم لهرمون التستوستيرون إلى DHT، وهو الهرمون الذي يحفِّز نمو البروستاتا. ومع انخفاض DHT تصغر البروستاتا تدريجياً، فيتسع مجرى البول. ولأن التصغير يحتاج وقتاً، تظهر الفائدة الكاملة خلال 3-6 أشهر — فهي ليست حلاً سريعاً وكثيراً ما تُوصف مع حاصرات ألفا سريعة المفعول.

ما الذي تتوقعه

- الأفضل للبروستاتا الأكبر حجماً؛ تتراكم الفائدة عبر الأشهر.
- تُؤخذ مرة واحدة يومياً ولفترة طويلة.
- مع الوقت تقلِّل خطر احتباس البول والحاجة إلى جراحة البروستاتا.

تعلم المصطلحات

5-ARI

مثبط 5-ألفا ريدكتيز (فيناستيريد، دوتاستيريد).

BPH

تضخم البروستاتا الحميد — بروتاتا متضخمة.

DHT

الهرمون الذي يحفِّز نمو البروستاتا؛ هذه الحبوب تخفِّضه.

PSA

تحليل دم للبروستاتا؛ هذه الحبوب تخفض رقمه إلى النصف تقريباً.

احتباس البول

عدم القدرة على تفريغ المثانة — يقلَّ خطره مع الوقت.

فيناستيريد / دوتاستيريد

الدواءان في هذه الفئة.

تؤثر على تحليل PSA تخفض هذه الحبوب مستوى PSA في الدم إلى النصف تقريباً. هذا لا يضرّك، لكن يجب أن يعرف طبيبك ذلك ليقرأ فحص سرطان البروستاتا بشكل صحيح — وعموماً يُضاعف رقم PSA لمقارنته بالطبيعي. تأكد أن يعرف كل طبيب أنك تتناولها.

كيف تتناولها

آثار جانبية شائعة

- مرة واحدة يومياً في الوقت نفسه تقريباً؛ كن صبوراً — الفائدة تحتاج أشهراً.
- لا تتوقف لمجرد أنك لا تشعر بتغيّر في وقت مبكر.
- كثيراً ما تُكمل لفترة طويلة للحفاظ على صغر البروستاتا.
- انخفاض الرغبة الجنسية أو صعوبة الانتصاب أو قلة السائل المنوي
- ألم أو تضخم في الثدي
- يُبلغ بعض الرجال عن آثار جنسية تستمر — ناقش أي مخاوف

أمان مهم

- يجب ألا تلمس الحامل الأقراص المكسورة أو المسحوقة (خطر على الجنين الذكر)؛ أما القرص الكامل المغلف فلمسه آمن.
- لا تتبرّع بالدم أثناء تناولها ولفترة بعد التوقف.
- أخبر فريقك الطبي بأي تغيّرات في المزاج أو اكتئاب، فقد أبلغ عنها.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- كتلة في الثدي أو ألم أو إفراز من الحلمة
- اكتئاب جديد أو تغيّرات في المزاج
- عدم القدرة على التبول (اطلب رعاية عاجلة)

ثلاثة أمور تذكّرها

1. تُصغّر مثبطات 5-ألفا ريدكتيز البروستاتا تدريجياً لتحسين التدفق وتقليل خطر الاحتباس والجراحة — امنحها 3-6 أشهر.
2. تخفض PSA إلى النصف تقريباً — تأكد أن يأخذ طبيبك ذلك في الحسبان عند فحص سرطان البروستاتا.
3. يجب ألا تلمس الحامل الأقراص المكسورة، ولا تتبرّع بالدم أثناء تناولها. أبلغ عن تغيّرات الثدي أو الاكتئاب الجديد.