

تسرب البراز العرضي يعني فقدان السيطرة على الغازات أو البراز — التسرب قبل الوصول إلى الحمام أو دون إدراك. هذه المشكلة أكثر شيوعاً مما يظن الناس، لا سيما بعد الولادة أو مع التقدم في السن، وهي قابلة للعلاج. لا داعي للإحراج؛ إخبار فريقك الطبي هو الخطوة الأولى نحو التحسن.

عن هذه الحالة

يعتمد التحكم في البراز على عضلات العضلة العاصرة الشرجية، وقاع الحوض، وقوام البراز، والأعصاب التي تنسق بينها. أي خلل في هذه العناصر قد يسبب التسرب — من تلوث طفيف وغازات إلى خسارة البراز المتشكّل.

الأسباب

- إصابة العضلة العاصرة — غالباً من الولادة (تمزق شديد) أو جراحة شرجية سابقة
 - البراز الرخو أو الإسهال — أصعب في الإمساك من البراز المتشكّل
 - الإمساك الشديد مع تسرب حول البراز الصلب
 - مشاكل عصبية، هبوط المستقيم، أو القولون العصبي
- في الغالب أكثر من سبب واحد في آنٍ، وكثير منها يمكن تحسينه.

تعلم المصطلحات

سلس البراز

فقدان لا إرادي للغازات أو البراز.

العضلة العاصرة الشرجية

حلقة عضلية تحبس البراز حتى تختار الذهاب إلى الحمام.

OASIS

تمزق ولادي شديد (الدرجة 3 أو 4) يطل العضلة العاصرة.

الآليات

مادة مكدّنة تُصلّب البراز الرخو وتُقلّل التسرب.

التغذية الراجعة (Biofeedback)

علاج يُعيد تدريب عضلات قاع الحوض والعضلة العاصرة.

التعديل العصبي العجزي

علاج بتحفيز الأعصاب يحسّن التحكم.

هل ثمة ما يساعد فعلاً؟ نعم — يتحسن معظم المرضى كثيراً، في الغالب بخطوات بسيطة كتصليب البراز وإعادة تدريب العضلات. الخيارات المتقدمة فعالة عند الحاجة. أصعب شيء هو إخبار فريقك؛ متى فعلت ذلك، ستجد مساراً واضحاً نحو تحكّم أفضل.

كيف تُشخّص

- تاريخ مرضي عن تكرار التسرّب وكميته وما يُثيره
- فحص العضلة العاصرة الشرجية وقاع الحوض
- أحياناً صدى الصوت على العضلة العاصرة، اختبارات المستقيم، أو التنظير

كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

- 1 **التحكّم في البراز** — إضافة الألياف لتصليبيه، وعلاج الإسهال أو الإمساك، واتباع روتين منتظم للتبرز.
- 2 **علاج قاع الحوض / التغذية الراجعة لتقوية العضلات وتنسيقها.**
- 3 **الأدوية (كمضادات الإسهال) عند الحاجة.**
- 4 **الخيارات المتقدمة** — التعديل العصبي العجزي، الحقن المُكثّف، أو إصلاح العضلة العاصرة.

التعايش معها

- اسعَ إلى براز متشكّل بالألياف والسوائل الكافية.
- افرغ الأمعاء في أوقات منتظمة؛ احمِ الجلد واحمل معك ما يلزم.
- تتبّع الأطعمة التي تزيد التسرّب (الكافيين، التوابل، المحليات الصناعية).

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- دم في البراز، أو براز أسود قطراني
- تغيير جديد أو ملحوظ في عادات التبرز، أو فقدان وزن غير مبرّر
- حمّى أو ألم شديد في البطن

ثلاثة أمور تُذكرها

1. تسرّب البراز العرضي شائع وقابل للعلاج — ليس شيئاً عليك تحمّله أو الصمت بشأنه.
2. يبدأ العلاج بتصليب البراز وإعادة تدريب العضلات، ثم ينتقل إلى تحفيز الأعصاب أو الإصلاح الجراحي عند الحاجة.
3. أخبر فريقك — هذه هي الخطوة الأساسية. أبلغهم عن الدم في البراز أو فقدان الوزن أو أي تغيير كبير في عادات التبرز.