

حاصرات ألفا أقراص ترخي العضلة في البروستاتا وعنق المثانة لتسهيل التبول — وهي الدواء الأول لأعراض البولية الناجمة عن تضخم البروستاتا الحميد (BPH). الأدوية الشائعة: **doxazosin**، **silodosin**، **alfuzosin**، **tamsulosin (Flomax)**، و **terazosin**. تعمل بسرعة لكنها لا تُصغر البروستاتا.

كيف تعمل

يضغط تضخم البروستاتا على قناة البول. حاصرات ألفا ترخي العضلة عند مخرج المثانة، مما يُقوّي تدفق البول ويُقلّل التردد والجهد والانقطاع. تعالج الأعراض — دون تغيير حجم البروستاتا، لذا تستمر الفائدة فقط طوال مدة تناولها.

ما الذي تتوقعه

- التحسن عادةً سريع — خلال أيام إلى أسبوعين.
- تُؤخذ غالبًا مرة يوميًا؛ tamsulosin بعد 30 دقيقة من نفس الوجبة يوميًا.
- doxazosin/terazosin تبدأ قبل النوم وتزداد جرعتها تدريجيًا للحد من الدوخة.
- يمكن دمجها مع دواء لتصغير البروستاتا في حالات التضخم الكبير.

تعلم المصطلحات

حاصر ألفا

قرص يُرخي العضلة عند مخرج المثانة.

BPH

تضخم البروستاتا الحميد.

عنق المثانة

المخرج العضلي بين المثانة والإحليل.

القذف الرجعي

ارتداد السائل المنوي إلى المثانة — غير ضار لكن الكمية تقل أو تنعدم.

انخفاض ضغط الدم الوضعي

دوخة عند النهوض بسبب انخفاض ضغط الدم.

IFIS

تأثير ترهل القزحية أثناء جراحة الساد (المياه البيضاء) — أخبر طبيب العيون.

هل ستجري جراحة الساد (المياه البيضاء)؟ أخبر طبيب العيون أنك تتناول (أو سبق أن تناولت) حاصر ألفا — قد يُسبب ترهل القزحية أثناء الجراحة (IFIS) ويحتاج التخطيط المسبق. هذا مهم حتى لو أوقفت الدواء مسبقاً.

كيف تتناولها

- تناولها في نفس الوقت يوميًا كما وُصف (tamsulosin بعد ~30 دقيقة من وجبة).
- مع doxazosin/terazosin، خذ الجرعة الأولى قبل النوم وانهض ببطء — قد يسبب انخفاض ضغط الدم المبكر دوخة.
- لا تضاعف الجرعة إذا نسيت جرعة.

أمان مهم

- انهض ببطء خاصةً في البداية لتجنب الدوخة أو الإغماء.
- توخَّ الحذر عند الجمع مع PDE5 inhibitors أو أدوية ضغط الدم (تزيد الدوخة).
- القذف الرجعي (سائل منوي قليل أو معدوم) شائع مع tamsulosin/silodosin — غير ضار ويعود للطبيعي عند الإيقاف.

آثار جانبية شائعة

- دوخة أو دوام؛ تعب
- احتقان الأنف
- قذف مخفف أو "جاف"

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- إغماء أو دوخة شديدة
- خفقان سريع أو ضربات قوية، أو ألم في الصدر
- عدم القدرة على التبول تمامًا (اطلب رعاية عاجلة)

ثلاثة أمور تذكرها

1. حاصرات ألفا ترخي مخرج المثانة بسرعة لتحسين تدفق البول في BPH — تخفف الأعراض دون تصغير البروستاتا.
2. انهض ببطء في البداية (دوخة)، واعلم أن القذف الجاف/المخفف شائع وغير ضار.
3. أخبر دائماً طبيب العيون قبل جراحة الساد أنك تتناول أو تناولت حاصر ألفا.