

هذه طريقة حديثة لفحص عمل المثانة دون استخدام قسطرة. يُوضع داخل المثانة مستشعر لاسلكي صغير يقيس الضغط أثناء الشرب والتقلّب وممارسة أنشطتك العادية — فيعكس الفحص السلوك الحقيقي للمثانة لا مجرد لقطة قصيرة في العيادة.

عن هذا الفحص

يعتمد فحص ديناميكا البول (urodynamics) التقليدي على أنابيب تملأ المثانة بالسائل داخل العيادة. هذا الفحص مختلف:

- يُدخل مستشعر حلقي صغير ناعم إلى المثانة عبر الإحليل (مجرى البول) — يستغرق ذلك أقل من دقيقة باستخدام مخدّر موضعي.
- تضع جهاز استقبال لاسلكي صغيراً يسجّل القراءات.
- تمتلئ مثانتك بشكل طبيعي عند الشرب، وتتبول بشكل طبيعي والمستشعر في مكانه.

لأنه يتابع نشاطك اليومي الفعلي، قد يكون مفيداً حين كان الفحص التقليدي مزعجاً أو غير واضح، أو حين تأتي الأعراض وتذهب. كما يعطي قراءات أكثر واقعية حين تعيق القسطرة العادية عملية إفراغ المثانة.

هل هو آمن؟

النتائج الأولية واعدة. صُمم المستشعر ليثبت في مكانه أثناء التبول دون أن يعيق التدفق، ولم تُرصد مشكلات خطيرة في الدراسات الأولى. المخاطر مشابهة لتلك المرتبطة بقسطرة قصيرة — حرقه خفيفة واحتمال ضئيل لعدوى البول. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يقيس ضغط المثانة فقط، لذا لا يُعني عن كل مكونات الفحص التقليدي.

تعلم المصطلحات

متقلّب (Ambulatory)

يُجرى أثناء التجوّل وممارسة الأنشطة اليومية، لا مستلقياً في العيادة.

المستشعر (Sensor)

الجهاز الحلقي الصغير داخل المثانة الذي يقيس الضغط.

جهاز الاستقبال اللاسلكي

وحدة صغيرة تضعها وتسجّل قراءات المستشعر.

بدون قسطرة (Catheter-free)

لا تُترك أنابيب في مكانها أثناء الفحص، خلافاً لـ urodynamics التقليدي.

الامتلاء الطبيعي

تمتلئ المثانة تلقائياً عند الشرب بدلاً من حقن سائل فيها.

التبول (Void)

إفراغ المثانة — يحدث بشكل طبيعي والمستشعر في مكانه.

مذكّرة التبول

سجل بسيط لأوقات الشرب والتبول قد يُطلب منك الاحتفاظ به.

ديناميكا البول (Urodynamics)

فحوصات تقيس كيف تخزن المثانة البول وتفرغه.

هل سيؤلم؟ يستغرق إدخال المستشعر ثوانٍ فقط مع مخدر موضعي، ويشعر المريض بضغط خفيف. لا يكاد معظم الناس يشعرون بالمستشعر بعد ذلك، ويحركون ويتبولون بشكل طبيعي. الإزالة سريعة — يُسحب المستشعر برفق عبر الإحليل بواسطة خيط صغير.

كيف تستعدّ (قبل الفحص)

- لا يُطلب منك سوى القليل. احضر مستعداً للشرب والبقاء طوال فترة المراقبة التي يحددها فريقك الطبي.
- تناول أدويةك المعتادة، واسأل عن ضرورة إيقاف أي أدوية للمثانة.
- إذا طلب منك ذلك، احتفظ بمذكرة بسيطة لأوقات الشرب والتبول أثناء الفحص.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:

- تُعاني من أعراض عدوى البول (حرقة، حمى، أو بول عكر ذو رائحة نفاذة) — قد يُؤجل الفحص عند وجود عدوى نشطة
- تتناول مضاداً للتخثر، أو لديك أي حساسية

ما الذي يحدث أثناء الفحص

- 1 تُنظف فتحة الإحليل ويُوضع مخدر موضعي.
- 2 يُدخل المستشعر الحلقي الصغير برفق إلى المثانة عبر الإحليل، ثم تضع جهاز الاستقبال اللاسلكي.
- 3 تشرب وتتحرك بشكل طبيعي والمستشعر يسجل القراءات، وتتبول متى احتجت.
- 4 بعد انتهاء فترة المراقبة، يُزال المستشعر برفق عبر الإحليل بواسطة خيطه.

بعد الفحص

- يمكنك العودة إلى أنشطتك العادية فوراً.
- قد تشعر بحرقة خفيفة عند التبول ليوم أو نحوه. شرب الماء الإضافي يُخفف ذلك.
- قد تلاحظ لوناً وردياً خفيفاً في البول لفترة قصيرة؛ هذا شائع ويزول عادةً خلال يوم.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- صعوبة في التبول أو عدم القدرة عليه كلياً
- نزيف غزير أو جلطات دموية في البول
- ألم يزداد سوءاً بدلاً من التحسن

ثلاثة أمور تذكرها

1. هذا فحص لاسلكي للمثانة بدون قسرة — مستشعر صغير يسجل سلوك مثانتك أثناء يومك الطبيعي.
2. لا يحتاج الفحص إلى تحضير كبير. احضر مستعداً للشرب والبقاء طوال فترة المراقبة، واحتفظ بمذكرة إن طلب، وأبلغ فريقك عن أي أعراض لعدوى.
3. الإدخال والإزالة يستغرقان ثوانٍ فقط وتعود إلى المنزل مباشرة. حرقة خفيفة أو لون وردي في البول ليوم أمر طبيعي — اشرب ماءً إضافياً، واتصل عند وجود حمى أو نزيف غزير أو صعوبة في التبول.