

مضادات الكولين (وتُسمى أيضًا مضادات المسكاريني) أقراص تهدئ فرط نشاط المثانة (OAB)، وتقلل الرغبة الملحة المفاجئة وكثرة التبول وسلس البول الإلحاحي. أبرز الأصناف: **oxybutynin** و **tolterodine** و **solifenacin** و **fesoterodine** و **darifenacin** و **tropium** (ويوفر **oxybutynin** أيضًا على شكل لصقة جلدية أو جل). وهي خيار فعال وذو تاريخ طويل في الاستخدام.

كيف تعمل

تعمل على حصر الإشارات التي تُحفّز عضلة المثانة على الانقباض، فتتقبض بتردد أقل وبصورة أهدأ أثناء الامتلاء. وتتراكم الفائدة خلال أسابيع قليلة؛ والدواء يعالج الأعراض طالما تتناوله.

ما الذي تتوقعه

- يبدأ التحسّن عادةً خلال أسابيع قليلة — امنحه وقتًا كافيًا قبل الحكم عليه.
- معظم الأشكال المطوّلة المفعول تُؤخذ مرة يوميًا.
- الأقراص المطوّلة المفعول واللصقة والجل تسبّب جفاف الفم أقل من **oxybutynin** قصير المفعول.

تعلم المصطلحات

فرط نشاط المثانة (OAB)

إلحاح التبول وكثرته بسبب انقباض المثانة مبكرًا.

مضاد الكولين / مضاد المسكاريني

فئة الأقراص التي تهدئ عضلة المثانة.

جفاف الفم

الأثر الجانبي الأكثر شيوعًا.

العبء الكولييني

التأثير التراكمي لتناول عدة أدوية من هذه الفئة معًا — مهم لدى كبار السن.

ناهض بيتا-3

نوع آخر من أقراص OAB بآثار جانبية أقل (بديل ممكن).

الجلوكوما ضيقة الزاوية

حالة عينية يُتجنب فيها عادةً استخدام هذه الأدوية.

ملاحظة لكبار السن قد تؤثر هذه الأدوية لدى كبار السن على **الذاكرة والتفكير**، وقد يرتبط الاستخدام المطول لعدة أدوية كولينية معًا بمخاوف إدراكية. إذا كان هذا مصدر قلق، فناهض **بيتا-3** بديلًا لـ OAB دون هذا الأثر — اسأل فريقك الطبي.

كيف تتناولها

- تناول مرة يوميًا كما وُصف؛ لا تتوقف مبكرًا إذا لم تنحسر الرغبة الملحة كليًا.
- إن أزعجك جفاف الفم، اسأل عن الشكل المطول المفعول أو اللصقة أو الجل.
- اجمع الدواء مع تدريب المثانة وتمارين قاع الحوض للحصول على أفضل النتائج.

أمان مهم

- يُتجنب عادةً في الجلوكوما ضيقة الزاوية غير المعالجة — أخبر فريقك عن أي حالات عينية.
- احرص عند وجود صعوبة في تفريغ المثانة، أو إمساك شديد، أو بعض حالات المعدة.
- قد يقلل التعرق — توجَّ الحذر في الطقس الحار تجنبًا للإجهاد الحراري.

آثار جانبية شائعة

- جفاف الفم والإمساك** (الأكثر شيوعًا)
- ضبابية الرؤية، جفاف العينين
- النعاس؛ وعند كبار السن: التشنُّش

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عجز عن التبول أو شعور بعدم الإفراغ
- تشوُّش جديد أو مشكلات في الذاكرة، خاصةً عند كبار السن
- إمساك شديد، أو ألم في العين أو احمرار مع ضبابية الرؤية

ثلاثة أمور تذكُّرها

- تهدي مصادات الكولين المثانة فرطة النشاط، فتتخفف الإلحاح وكثرة التبول وسلس البول؛ أعطها أسابيع قليلة.
- جفاف الفم والإمساك شائعان — الأشكال المطولة واللصقة والجل تساعد في التخفيف.
- قد تؤثر على التفكير لدى كبار السن؛ ناهض بيتا-3 بديل. اتصل إذا تعذَّر التبول أو ظهر تشوُّش جديد.