

Aquablation جراحة حديثة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) تستخدم نفاثة مائية عالية الضغط وخالية من الحرارة، موجّهة بالموجات فوق الصوتية وتُجرى عبر الإحليل (مجرى البول)، لإزالة الأنسجة الضاغطة على مجرى البول بدقة. تهدف إلى تحسين التدفق مع الحفاظ على الوظيفة الجنسية — وقد أظهرت الدراسات معدلاً أقل من القذف الرجعي مقارنةً بـ TURP.

عن هذا الإجراء

يستخدم الجراح منظراً وصورة موجات فوق صوتية حية للبروستاتا لتحديد الأنسجة المراد إزالتها بدقة. ثم تُزيل نفاثة مائية يتحكم فيها الروبوت تلك الأنسجة دون حرارة. تُجرى بعدها خطوة كيّ قصيرة للسيطرة على النزيف، وتوضع قسطرة مؤقتة.

لماذا Aquablation؟

- موجّهة بالصورة ودقيقة، وتناسب مختلف أحجام البروستاتا بما فيها الكبيرة
 - تحسّن تدفق البول مشابه لـ TURP
 - مصمّمة للحفاظ على القذف بصورة أفضل من TURP
- هي خيار حديث نسبياً وما زالت بيانات المدى البعيد تتراكم.

تعلم المصطلحات

Aquablation

إزالة أنسجة البروستاتا بالنفاثة المائية لعلاج BPH.

BPH

تضخم البروستاتا الحميد (غير السرطاني).

خالي من الحرارة

يستخدم ضغط الماء لا الحرارة لإزالة الأنسجة.

موجّه بالموجات فوق الصوتية

صورة حية تتيح للجراح تحديد منطقة العلاج بدقة.

القذف الرجعي

نشوة جافة — أقل شيوعاً بعد Aquablation من TURP.

القسطرة

أنبوب لتصريف المثانة ليوم أو يومين بعد الإجراء.

كيف تختلف عن TURP؟ تُزيل أنسجة البروستاتا بنفثة مائية دقيقة وخالية من الحرارة موجهة بالموجات فوق الصوتية بدلاً من حلقة كهربائية. نتائج التدفق مشابهة لـ TURP، لكنها أكثر حفاظاً على **القذف**. من نقاط التوازن أنها أحدث مع بيانات مدى بعيد أقل، وتُدار المضاعفات التنزيفية بخطوة كي قصيرة.

كيف تستعدّ

- تُجرى تحت تخدير عام أو نخاعي — اتبع تعليمات الصيام والأدوية (وقّف ممّيعات الدم حسب التعليمات).
- تحليل بول لاستبعاد العدوى قبل الإجراء.
- رتّب لمرافق يوصلك؛ القسطرة تُزال بعد وقت قصير.

ما الذي يحدث وبعده

- 1 تكون نائماً أو مخدراً؛ تُعطى مضادات حيوية.
 - 2 ترسم الموجات فوق الصوتية البروستاتا ويخطّط الجراح منطقة العلاج.
 - 3 تُزيل النفثة المائية الأنسجة؛ ثم تُجرى خطوة قصيرة للسيطرة على النزيف.
 - 4 توضع قسطرة تُزال عادةً بعد 1-2 يوم؛ ليلة واحدة في المستشفى في الغالب.
- توقّع بولاً مصحوباً بالدم وبعض الحرقنة وإحاح التبول لأسبوعين؛ اشرب السوائل وتجنّب الجهد والرفع الثقيل.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول بعد إزالة القسطرة
- نزيف غزير أو جلطات تعيق التدفق
- حمّى أو قشعريرة
- نزيف يزداد بدلاً من أن يتحسن

ثلاثة أمور تنكّرها

1. Aquablation تُزيل أنسجة البروستاتا المضاعطة بنفثة مائية دقيقة وخالية من الحرارة وموجهة بالموجات فوق الصوتية عبر الإحليل.
2. نتائج التدفق مشابهة لـ TURP مع فرصة أفضل للحفاظ على القذف؛ هي أحدث وبيانات المدى البعيد ما زالت تتراكم.
3. مدة القسطرة قصيرة. اتصل بالفريق إذا عجزت عن التبول أو كان النزيف غزيراً أو ظهرت حمّى.