

Cysto-urétrographie mictionnelle (VCUG)

Information pour le patient · Ce à quoi vous attendre avant votre radiographie de la vessie et de l'urètre

WARWIKI

La cysto-urétrographie mictionnelle — ou « VCUG » — est une radiographie qui prend des images de votre vessie et de votre urètre pendant que la vessie est remplie d'un produit de contraste et pendant la miction. Elle montre comment votre vessie se remplit et se vide, et aide votre équipe soignante à détecter des problèmes comme le reflux d'urine vers les reins, un rétrécissement ou une fuite.

À propos de cet examen

Votre vessie stocke l'urine, et l'urètre est le canal qui la conduit hors du corps. La VCUG remplit la vessie avec un produit de contraste qui apparaît en blanc sur les radiographies, puis enregistre des images pendant que vous urinez. Parce qu'elle capture la vessie et l'urètre *en action*, elle révèle des anomalies qu'une image fixe ne pourrait pas montrer.

Votre équipe soignante peut prescrire une VCUG pour :

- Observer comment votre vessie se remplit et se vide
- Vérifier si l'urine remonte vers les reins (reflux)
- Examiner le col de la vessie et l'urètre pendant la miction
- Détecter un rétrécissement, une fuite ou une poche (diverticule)
- Contrôler la cicatrisation après une chirurgie de la vessie, de la prostate ou de l'urètre

L'examen porte sur la partie basse des voies urinaires — la vessie et l'urètre. Il guide votre prise en charge, ce n'est pas un traitement.

Est-ce sans danger ?

Oui. La VCUG est un examen courant et peu risqué. La dose de rayonnement est faible, et le produit de contraste est éliminé dans les urines. Le risque le plus fréquent est une légère infection urinaire due à la sonde — c'est pourquoi une technique stérile est utilisée et un antibiotique est parfois prescrit. Un léger inconfort, une brève sensation de brûlure ou un peu de sang dans les urines après l'examen sont habituellement bénins et disparaissent rapidement.

COMPRENDRE LES TERMES

Vessie

L'organe qui stocke l'urine jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à uriner.

Urètre

Le canal qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur du corps.

Sonde

Un tube souple et fin qui draine ou remplit la vessie. Le produit de contraste peut passer par une sonde déjà en place ou par une sonde introduite dans l'urètre pour l'examen.

Cathéter sus-pubien (CSP)

Une sonde qui draine la vessie par une petite ouverture dans le bas-ventre, et non par l'urètre. Si vous en avez un, il peut être utilisé pour remplir la vessie lors de l'examen.

Produit de contraste

Un liquide qui apparaît en blanc sur les radiographies pour visualiser la vessie et l'urètre.

Miction

L'action d'uriner — de vider la vessie. Les images les plus importantes sont prises pendant la miction.

Reflux

Remontée de l'urine de la vessie vers les reins. La VCUG peut le mettre en évidence.

Fluoroscopie

Un type de radiographie qui produit des images en temps réel pendant que le produit de contraste s'écoule.

Image post-mictionnelle

Une image prise après la miction pour évaluer le degré de vidange de la vessie.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Si vous avez déjà une sonde ou un cathéter sus-pubien, le produit de contraste passe par cette voie — rien de nouveau n'est posé. Sinon, une fine sonde est introduite (légère pression). Vous serez invité(e) à uriner pendant l'examen, qui dure environ 30 minutes.

Comment vous préparer (avant l'examen)

La préparation est très simple. Dans la plupart des cas :

- Si vous avez déjà une **sonde urinaire ou un cathéter sus-pubien**, laissez-le en place — il sera généralement utilisé pour remplir votre vessie, donc aucune nouvelle sonde n'est nécessaire.
- Vous pouvez **manger et boire normalement** et prendre vos **médicaments habituels**, sauf avis contraire de votre équipe.
- Vous pouvez généralement **conduire pour rentrer chez vous**, car aucune sédation n'est nécessaire pour la plupart des adultes.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez déjà eu une réaction au produit de contraste ou à l'iode
- Prenez un anticoagulant
- **Pourriez être enceinte** — les radiographies sont généralement évitées pendant la grossesse
- Présentez des signes d'infection urinaire (brûlures, fièvre, urine trouble ou malodorante) — une infection active peut entraîner le report de l'examen

On pourra vous demander un **échantillon d'urine** pour dépister une infection, et un **antibiotique** pourra être prescrit pour réduire ce faible risque.

Déroulement de l'examen

- 1 Vous vous allongez sur une table de radiographie.
- 2 **Le produit de contraste est introduit dans votre vessie.** Si vous avez déjà un **cathéter sus-pubien** ou une **sonde urétrale**, il passe par cette voie — **rien de nouveau n'est posé**. Sinon, une fine sonde est introduite par l'urètre.
- 3 La vessie est remplie progressivement avec le produit de contraste. Vous ressentirez une sensation de plénitude croissante, comme l'envie d'uriner. Des images sont prises au fil du remplissage.
- 4 Lorsque votre vessie est pleine, on vous demandera d'**uriner pendant l'enregistrement** — la partie la plus importante. La sonde est généralement retirée avant.
- 5 Une image finale peut être prise après la miction pour évaluer la vidange de la vessie.

Après l'examen

- Vous pouvez généralement rentrer chez vous et reprendre **vos activités normales immédiatement**.
- Vous pourrez ressentir de légères **brûlures** en urinant ou noter un peu de **sang ou une teinte rosée** dans les urines pendant un jour environ — boire davantage d'eau aide.
- Si vous avez une **sonde ou un cathéter sus-pubien**, votre équipe vous expliquera comment en prendre soin.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Des difficultés à uriner, ou une impossibilité totale d'uriner
- Un saignement abondant ou qui ne s'arrête pas
- Une douleur qui s'aggrave au lieu de diminuer

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La VCUG est une radiographie qui remplit la vessie de produit de contraste et filme la miction — elle montre le fonctionnement de la vessie et de l'urètre et détecte un reflux vers les reins.
2. Peu de préparation : mangez et prenez vos médicaments normalement — mais signalez toute allergie au contraste, tout anticoagulant, une possible grossesse ou des signes d'infection urinaire.
3. Le produit de contraste passe par une sonde déjà en place ou une fine sonde posée pour l'examen ; puis vous urinez pendant l'enregistrement. Brûlures légères ou traces de sang pendant un jour sont normales — buvez davantage d'eau.