

Cystoscopy

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Pagtingin sa loob ng pantog at urethra

Ang cystoscopy ay nagbibigay-daan sa inyong siruhano na tumingin sa loob ng inyong urethra at pantog (bladder) gamit ang isang manipis na teleskopyo na may maliit na camera at ilaw, na maingat na isinasalang sa natural na butas ng ihi. Nakakatulong ito para mahanap ang sanhi ng dugo sa ihi, impeksiyon, pagsikip, o ibang problema sa pantog — at para suriin ang isang pagkukumpuni.

Tungkol sa Pagsusuring Ito

Ang **cystoscope** ay isang manipis na tubo na may camera sa dulo. May dalawang uri:

- Ang **flexible (nakayuko) na cystoscope** ay karaniwang ginagamit sa opisina habang kayo ay gising, na may numbing gel (pampamanhid).
- Ang **rigid (tuwid) na cystoscope** ay ginagamit sa operating room habang kayo ay natutulog, at nagbibigay-daan sa siruhano na gamutin din ang problema sa parehong pagbisita.

Ang sterile na likido ay pinaikot para mabukas nang malambot ang pantog at makita nang malinaw ang mga dingding nito. Maaaring mag-order ng cystoscopy ang inyong siruhano para:

- Mahanap ang sanhi ng **dugo sa ihi** o paulit-ulit na impeksiyon
- Tumingin para sa **pagsikip ng urethra (stricture)**, bato, o bukol
- Suriin kung paano gumagaling ang isang pagkukumpuni, o kumuha ng maliit na sample (biopsy)
- Maglagay, suriin, o mag-alis ng **stent** o tahi

Ligtas Ba Ito?

Oo. Ang cystoscopy ay isa sa mga pinakakaraniwang pagsusuri sa urolohiya at mababa ang panganib. Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang ng maikling kakulangan. Ang hindi karaniwang side effect — tulad ng impeksiyon sa ihi (UTI), kaunting pagdurugo, o pansamantalang pangangati o hirap sa pag-ihing — ay karaniwang banayad at mabilis na lumilipas.

MGA TERMINO

Cystoscope

Isang manipis na teleskopyo na may camera at ilaw para tumingin sa loob ng pantog.

Bladder (pantog)

Ang malambot na lalagyan ng kalamnan na nag-iimbak ng ihi hanggang sa pag-ihing.

Urethra

Ang tubo na nagdadala ng ihi palabas ng katawan.

Flexible vs. rigid

Ang nakayukong scope (gising, sa opisina) o tuwid na scope (natutulog, sa operating room).

Numbing gel (pampamanhid)

Isang local anesthetic na inilalagay sa urethra para malagpasan nang komportable ang scope.

Biopsy

Isang maliit na sample ng tisyu na kinukuha para tingnan sa ilalim ng mikroskopyo.

Stent

Isang malambot na tubo na nagpapabukas ng daanan; maaaring ilagay o alisin sa panahon ng pagsusuri.

Post-void residual

Ang dami ng ihi na nananatili sa pantog pagkatapos umihi.

MASAKIT BA? Sa flexible scope, maaari kayong makaramdam ng maikling presyon o pangangati — nakakatulong ang numbing gel, at karaniwang tapos sa ilang minuto. Sa rigid scope, natutulog kayo sa anesthesia at walang nararamdaman. Sabihin sa care team kung hindi kayo komportable.

Paano Maghanda (Bago ang Pagsusuri)

- Para sa **opisina (flexible)** na cystoscopy, karaniwang maaari kayong **kumain, uminom, at uminom ng inyong karaniwang gamot**, at magmaneho pauwi.
- Para sa cystoscopy **sa ilalim ng anesthesia**, sundin ang inyong mga tagubilin sa operasyon — pag-aayuno, kung aling gamot ang ihihinto, at mag-ayos ng sasakyan pauwi.
- Maaari kayong hilingang magbigay ng **sample ng ihi** para suriin ang impeksiyon, at maaaring bigyan ng **antibiotic**.

Sabihin sa inyong care team **nang maaga** kung kayo ay:

- Umiinom ng **blood thinner**
- May palatandaan ng **impeksiyon sa ihi** (pangangati, lagnat, o maulap o mabahong ihi) — ang aktibong impeksiyon ay maaaring dahilan para ipagpaliban ang pagsusuri
- May allergy, o may pagsikip na nagpahirap sa pagdaan ng scope noon

Ano ang Nangyayari sa Panahon ng Pagsusuri

- 1 Humiga kayo nang komportable at tinutulungan kayo ng care team na pumosisyon. Ang butas ay nilinis at inilalagay ang numbing gel.
- 2 Ang cystoscope ay maingat na isinasalang sa urethra papasok sa pantog.
- 3 Ang sterile na likido ay pinaikot para mabukas ang pantog, at sinusuri ng inyong siruhano ang panloob na dingding sa lahat ng bahagi.
- 4 Inilalabas ang scope. Kung may planong paggamot, biopsy, o pagpapalit ng stent, ginagawa ito bago alisin ang scope.

Pagkatapos ng Pagsusuri

- Pagkatapos ng pagsusuri sa opisina, karaniwang maaari kayong bumalik agad sa **normal na gawain**; pagkatapos ng anesthesia, kailangan ninyong magpahinga at magkaroon ng sasakyan pauwi.
- Maaari kayong makaramdam ng **banayad na pangangati kapag umiihi** sa loob ng isang araw. Ang pag-inom ng mas maraming tubig ay nakatulong na maalís ito.
- Maaari kayong makakita ng **bahagyang pink** sa inyong ihi sa maikling panahon. Ito ay karaniwan at karaniwang nawawala sa loob ng isang araw.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o pangginginig
- Hirap sa pag-ihì, o hindi kayo makaihi
- Malakas na pagdurugo, o dugo-dugo sa ihi
- Sakit na lumalalâ sa halip na gumaling

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang cystoscopy ay mabilis at ligtas na pagtingin sa loob ng pantog at urethra gamit ang manipis na camera — para mahanap ng siruhano ang problema o masuri ang isang pagkukumpuni.
2. Kaunti lamang ang kailangang ihanda para sa pagsusuri sa opisina. Para sa pagsusuri sa ilalim ng anesthesia, sundin ang tagubilin sa pag-aayuno at mag-ayos ng sasakyan. Sabihin sa inyong care team ang tungkol sa blood thinners o palatandaan ng impeksiyon.
3. Normal ang banayad na pangangati o kaunting pink sa ihi sa loob ng isang araw — uminom ng dagdag na tubig.