

Mga Fistula — Genitourinary at Rectovaginal

Impormasyon para sa Pasyente · Abnormal na koneksyon na nagdudulot ng pagtagas ng ihi, hangin, o dumi

WARWIKI

Ang fistula ay isang abnormal na maliit na tunel sa pagitan ng dalawang organ na hindi dapat konektado. Sa pelvis, maaari itong mabuo sa pagitan ng **pantog (o ureter/urethra) at ng puki (vagina)** — na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagtagas ng ihi — o sa pagitan ng **tumbong (rectum) at ng puki** — na nagpapahintulot na makapasok ang hangin o dumi sa puki. Hindi madaling gumaling ang fistula nang kusa, ngunit maaari itong ayusin.

Tungkol sa Kondisyong Ito

- **Genitourinary fistula** (hal., vesicovaginal) — **tuloy-tuloy at hindi makontrol na pagtagas ng ihi** mula sa puki, araw at gabi.
- **Rectovaginal fistula** — pagdaan ng **hangin o dumi sa puki**, paulit-ulit na impeksiyon, at pangangati.

Ang mga sintomas ay nakababagabag at nakaka-isa — ngunit ito ay isang problema sa "tubo" na may solusyon, hindi ito bunga ng inyong pagkakamali.

Mga Sanhi

- **Operasyon sa pelvis o sa sistema ng reproduksiyon** (tulad ng hysterectomy o pag-alis ng matris) — ang pinakakaraniwang sanhi sa maraming bansa
- **Panganganak** — lalo na ang matagal at mahirap na panganganak (isang pangunahing sanhi sa buong mundo)
- **Radiation**, inflammatory bowel disease, impeksiyon, o (bihirang) kanser

MGA TERMINO

Fistula

Abnormal na tunel na nagkokonekta sa dalawang organ.

Vesicovaginal

Fistula sa pagitan ng pantog at puki.

Rectovaginal

Fistula sa pagitan ng tumbong (rectum) at puki.

Dye test

Paglalagay ng may-kulay na likido sa pantog o tumbong para mahanap ang tagas.

Cystoscopy

Pagtingin sa loob ng pantog gamit ang camera para makita ang butas.

Martius flap

Tissue flap na ginagamit para palakasin ang tahi ng repair.

Diversion

Pansamantalang paraan para ilihis ang ihi o dumi habang gumagaling.

MAAARI BA ITONG AYUSIN? Oo — karamihan sa mga fistula ay maaaring ayusin, at maraming pasyente ay ganap na gumagaling. Minsan ang maliit at bagong fistula ay nagsasara nang kusa sa tulong ng catheter, ngunit karamihan ay nangangailangan ng planong operasyon. Mahalaga ang tamang oras: madalas na hinihintay ng mga siruhano na maging tahimik ang pamamaga bago mag-opera para mas matagumpay ang pagtahi.

Paano Ito Nasusuri

- Pagsusuri, kadalasang may **dye test** para matukoy nang eksakto kung nasaan ang tagas
- **Cystoscopy** at imaging para malaman ang sukat, lokasyon, at posibleng sanhi
- Pagsuri kung may nag-aambag na kondisyon (epekto ng radiation, impeksiyon, IBD)

Paano Ito Ginagamot

- 1 **Conservative care** — ang maliit at bagong urinary fistula ay maaaring magsara sa pamamagitan ng catheter na iniwan ng ilang linggo.
- 2 **Surgical repair** (operasyon) — pagsasara ng tunel sa pamamagitan ng vaginal o abdominal na diskarte, kadalasang sa maraming patong.
- 3 **Tissue flap** — malulusog na tissue (tulad ng Martius flap) ay maaaring gamitin para palakasin ang tahi, lalo na pagkatapos ng radiation.
- 4 **Pansamantalang diversion** — para sa ilang rectovaginal fistula, pansamantalang inililihis ang dumi para makagaling ang tahi.

Mabuting Malaman

- Protektahan ang balat at gumamit ng pads habang naghihintay ng operasyon; tutulungan kayo ng inyong care team para maramdamang mas komportable.
- Ang mga repair pagkatapos ng **radiation** ay mas kumplikado at karaniwang nangangailangan ng tissue flap.
- Maaaring may catheter kayo at isang **healing test** bago ito alisin.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o pangininginig, o lumalalang sakit sa pelvis
- Mga tanda ng impeksiyon, o malakas na pagdurugo
- Pagkatapos ng repair: tumitigil ang drainage ng catheter, o bumabalik ang pagtagas

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang fistula ay abnormal na koneksyon na nagdudulot ng pagtagas ng ihi (genitourinary) o pagdaan ng hangin/dumi sa puki (rectovaginal).
2. Karamihan ay maaayos — ang iilan at maliliit ay nagsasara sa catheter, ngunit karamihan ay nangangailangan ng planong operasyon, minsan na may tissue flap.
3. Mahalaga ang tamang oras; maaaring maghintay ang inyong care team para maging tahimik ang pamamaga. lulat ang lagnat, mga tanda ng impeksiyon, o pagbabalik ng tagas pagkatapos ng repair.