

HoLEP (Holmium Laser Enucleation)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Laser surgery para sa napalaking prostate ng anumang laki

Ang HoLEP ay isang laser surgery para sa napalaking prostate (paglaki ng prostate o BPH) na nag-aalis ng harang na tisyu sa loob sa pamamagitan ng scope — nang **walang hiwa sa labas ng katawan**. Ang pangunahing kalamangan nito ay gumagana ito para sa **anumang laki ng prostate**, kasama na ang malalaking glandula na dati ay kailangang pabuksan, na may kaunting pagdurugo at pangmatagalang resulta.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Sa pamamagitan ng scope sa urethra, ang **holmium laser** ay naghihiwalay ng buong panloob na prostate (ang bahaging nagdudulot ng harang) mula sa panlabas na balot nito — tulad ng pagtatanggal ng prutas mula sa balat nito. Ang natanggal na tisyu ay itutulak sa pantog at sisirain at aalisin (**morcellation**). Dahil tinatanggal nito ang buong harang, ang resulta ay **pangmatagalan** at bihirang kailangan ng muling paggamot.

Bakit Pipiliin ang HoLEP

- **Gumagana para sa anumang laki** ng prostate, kasama ang malalaking glandula
- **Kaunting pagdurugo** — maaaring angkop para sa mga lalaking umiinom ng blood thinners
- Maikling panahon ng catheter at pangmatagalang resulta

Ito ay espesyal na pamamaraan — pinakamabuting resulta ang makukuha sa isang bihasang siruhano.

MGA TERMINO

HoLEP

Holmium laser enucleation ng prostate.

BPH

Benign (hindi cancer) na paglaki ng prostate.

Enucleation

Pag-aalis ng buong panloob na prostate mula sa panlabas na balot nito.

Holmium laser

Ang laser na ginagamit para paghiwalayin at i-seal ang tisyu nang may kaunting pagdurugo.

Morcellation

Pagdurog ng natanggal na tisyu para maalis ito.

Retrograde ejaculation

Dry orgasm — karaniwang hindi mapanganib na side effect.

ANO ANG MAGBABAGO PAGKATAPOS? Karamihan sa mga lalaki ay makakakuha ng malakas at pangmatagalang daloy ng ihi. Tulad ng ibang surgery sa prostate, ang **retrograde ejaculation** (dry orgasm) ay karaniwan. Ang ilang lalaki ay may pansamantalang pagnanais umihi o kaunting pagtagas ng ihi sa unang ilang linggo na halos lahat ay gumagaling; ang seryosong epekto sa erection o pangmatagalang hindi makontrol na pag-ihing ay bihira.

Paano Maghanda

- Isinasagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang mga tagubilin sa pag-aayuno at gamot.
- Isang **pagsusuri ng ihi** upang matiyak na walang impeksiyon bago ang operasyon.
- Mag-ayos ng sasakyan pauwi; maghanda para sa maikling panahon ng catheter.

Ano ang Nangyayari & Pagkatapos

- 1 Kayo ay natutulog o manhid; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Ang laser ay nag-e-enucleate ng panloob na prostate, na sisirain at aalisin pagkatapos.
- 3 Inilalagay ang catheter, karaniwan ay tinatanggal pagkalipas ng **isang araw**; marami ang umuuwi sa araw ding iyon o pagkatapos ng isang gabi.

Asahan ang **ihing na may bahid ng dugo** at kaunting hapdi o pagnanais umihi sa loob ng ilang linggo; magsagawa ng pelvic floor exercises (Kegel) kung inirerekomenda, at iwasan ang pag-igting at mabigat na pagbubuhat.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi kayo makaihi** pagkatapos matanggal ang catheter
- **Malakas na pagdurugo o clots** na humaharag sa daloy
- Lagnat o panginig
- Pagtagas ng ihi na hindi gumagaling sa loob ng unang ilang linggo

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Gumagamit ang HoLEP ng laser para alisin ang buong harang na panloob na prostate sa pamamagitan ng scope — gumagana ito para sa **anumang laki**, na may kaunting pagdurugo at pangmatagalang resulta.
2. Asahan ang malakas na daloy ng ihi; ang dry (retrograde) ejaculation ay karaniwan, at ang maagang pagnanais umihi o pagtagas ay karaniwang gumagaling.
3. Maikling panahon ng catheter. Tumawag para sa kawalan ng kakayahang umihi, malakas na pagdurugo, o lagnat.