

Implantable Tibial Nerve Stimulation (ITNS)

Impormasyon para sa Pasyente · Maliit na implant malapit sa bukung-bukong para sa overactive bladder

WARWIKI

Ang ITNS ay isang maliit na device na inilalagay malapit sa bukung-bukong upang malambot na pag-utusan ang **tibial nerve** at papayapain ang **overactive bladder** — biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, at hindi makontrol na pag-ihi. Katulad ng PTNS (ang paggamot sa bukung-bukong sa klinika) ang paraan, ngunit dahil ang device ay **implanted**, matatanggap mo ang therapy **sa bahay** at hindi na kailangang bumalik linggo-linggo sa opisina.

Paano Ito Gumagana

Ang tibial nerve, malapit sa loob ng bukung-bukong, ay konektado sa mga spinal nerve na kumokontrol sa pantog. Ang mahinahong pag-stimulate rito ay nagpapadala ng mga signal na **nagtuturo at nagpapakalma** sa sobrang-aktibong pantog — binabawasan ang biglaang pangangailangang umihi at ang pagtagas. Ang implant ang nagbibigay ng mga pulso para sa iyo, kaya hindi na kailangan ng paulit-ulit na pagbisita sa klinika. Walang gamot at walang side effect sa buong katawan.

Angkop Ba Ito para sa Akin?

- Magandang pagpipilian para sa **overactive bladder** (biglaang pangangailangang umihi, madalas na pag-ihi, urge leakage), lalo na kung hindi gumana ang gamot o nagdulot ito ng side effect
- Walang gamot — kapaki-pakinabang kung hindi ka makainom ng bladder medicines
- Madalas pinipili ng mga taong nakita ang **in-office PTNS na epektibo** ngunit mahirap ituloy linggu-linggo
- Hindi tulad ng sacral “bladder pacemaker,” karamihan sa ITNS devices ay **hindi nangangailangan ng trial period** bago magsimula

MGA TERMINO

Overactive bladder

Biglaang pangangailangang umihi at madalas na pag-ihi dahil sa pantog na kumikilos nang maaga.

Tibial nerve

Isang nerve malapit sa bukung-bukong na konektado sa nerve supply ng pantog.

Neuromodulation

Paggamit ng mahinahong electrical pulses upang payapain ang sobrang-aktibong mga nerve.

Implant

Maliit na device na inilalagay sa ilalim ng balat sa maikling prosedura.

Wearable

Tinatanggal na ankle band na nagpapagana at nagkokontrol sa ilang device.

Local anesthesia

Gamot na pampamanhid upang hindi maramdam ng sakit sa lugar habang gising ka.

MASAKIT BA? Ang device ay inilalagay sa pamamagitan ng isang **maikling outpatient procedure** gamit ang pampamanhid na gamot (local anesthesia) — gising ka ngunit hindi dapat maramdaman ang sakit, kundi bahagyang presyon lamang. Ang therapy mismo ay parang mahinahong **tingling** o banayad na pag-kulo ng daliri sa paa, hindi sakit. Karamihan ay nakakauwi na sa parehong araw.

Paano Ito Isinasagawa

- 1 Sa pamamagitan ng isang **maliit na hiwa malapit sa bukung-bukong**, ang device ay inilalagay malapit sa tibial nerve — karaniwang sa ilalim ng local anesthesia, sa loob ng mga **20–35 minuto**.
- 2 Isinasara ang lugar at pinagagaling; ang therapy ay karaniwang nagsisimula **ilang linggo pagkatapos**.
- 3 Itatakda ng iyong care team ang mga setting at ipapakita sa iyo kung paano gumagana ang device.

Dalawang Uri ng Device

- Ang isang uri ay **fully implanted at may sariling baterya** — walang susuotin o ichi-charge; awtomatiko itong nag-stimulate ayon sa nakatakdang iskedyul.
- Ang isa naman ay **walang baterya sa loob**; nagsusuot ka ng maliit na **ankle band** na nagpapagana nito at nagbibigay-daan sa iyong magsagawa ng sariling mga session sa bahay.
- Sasabihin ng iyong siruhano kung alin ang device na gagamitin mo at kung paano ito gamitin.

Pagkatapos

- Maaring may bahagyang sakit o pamamaga sa bukung-bukong sa loob ng ilang araw; panatilihin malinis at tuyo at iwasang mabigat na aktibidad habang gumagaling.
- Ang benepisyo ay **unti-unting lumalaki sa loob ng mga linggo** — karamihan ay nakakakuha ng kalahati o higit pang pagbabago, at tatagal ang epekto ng maraming taon.
- Maaari itong **i-off o alisin** kung kinakailangan. Ang mga patakaran sa MRI ay nag-iiba ayon sa device — laging sabihin sa anumang imaging team na mayroon kang implant.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Pamumula, pamamaga, pagtagas, o lagnat (posibleng impeksiyon)
- Bago o lumalalang sakit sa lugar ng bukung-bukong
- **Biglaang pagkawala ng benepisyo** o hindi komportableng stimulation

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang ITNS ay maliit na implant malapit sa bukung-bukong na nagpapakalma ng overactive bladder — ang bersyon sa bahay ng PTNS, walang gamot at walang side effect sa katawan.
2. Inilalagay ito sa maikling outpatient procedure, karaniwang sa ilalim ng local anesthesia, at karamihan sa mga device ay **hindi nangangailangan ng trial period** bago magsimula.
3. Ang benepisyo ay lumalaki sa loob ng mga linggo at tatagal ng maraming taon.