

Inflatable Penile Prosthesis (IPP)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Ano ang aasahan bago ang operasyon ng penile implant

Ang inflatable penile prosthesis (IPP) ay isang device na inilalagay sa ilalim ng balat upang makagawa ng matibay na erection (pagtigas ng ari) ayon sa inyong kagustuhan — para sa mga lalaking hindi nakinabang sa gamot, iniksyon, o ibang paggamot para sa erectile dysfunction. Kinokontrol ninyo ito gamit ang isang pump na nakatago sa bayag (scrotum). Ipinapaliwanag ng handout na ito kung paano ito gumagana, paano maghanda, at ano ang inaasahan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Kapag ang **erectile dysfunction (ED)** ay hindi gumaling sa gamot, vacuum device, o iniksyon, ang implant ang pinaka-epektibong susunod na hakbang, na may napakataas na antas ng kasiyahan. Tatlong bahagi ang inilalagay, lahat nakatago sa ilalim ng balat:

- Dalawang malambot na **cylinders** sa loob ng ari (penis) na napupuno ng likido upang tumibay
- Isang **pump** sa bayag (scrotum) na pinipiga para magpalaki (inflate) at pinipindot para magpaliit (deflate)
- Isang **reservoir** (lalagyan ng likido) sa ibabang bahagi ng tiyan

Paano gamitin: piguiin ang pump nang ilang beses upang mapuno ang cylinders para sa erection; pindutin ang release valve upang maging malambot muli. Kayo ang nagpapasya kung kailan at gaano katagal.

Mga Dapat Malaman

Ito ay isang **permanenteng pagpipilian**. Binabago ng implant ang erectile tissue, kaya pagkatapos ay hindi na gumagana ang natural na erection at ibang paggamot para sa ED (gamot, iniksyon) — ang implant na ang paraan ng pagtigas ng ari. Mahalaga: **hindi nito binabago ang pag-ih, pakiramdam, orgasm, o paglabas ng tamod (ejaculation)**. Tulad ng anumang implant, may panganib ito — pangunahin ay impeksiyon, at maaaring masira ang device pagkalipas ng maraming taon at kailangang palitan.

MGA TERMINO

Erectile dysfunction (ED)

Hirap makakuha o mapanatili ng sapat na pagtigas ng ari para sa pakikipagtalik.

Penile prosthesis (IPP)

Ang inilalagay na device na gumagawa ng erection ayon sa inyong kagustuhan.

Cylinders

Dalawang bahagi sa loob ng ari na napupuno ng likido para tumibay.

Pump

Ang bahagi sa bayag na pinipiga para magpalaki at pinipindot para magpaliit.

Reservoir

Ang lalagyan ng likido na inilalagay sa ibabang tiyan.

Activation

Ang pagbisita ~4–6 linggo pagkatapos ng operasyon kung saan unang ginagamit ang device at tinuturuan kayo.

Cycling

Pag-inflate at deflate araw-araw pagkatapos gumaling — pinapanatili itong gumagana nang maayos.

General anesthesia

Gamot na nagpapatulog at nagpapawalang-sakit sa operasyon.

MASAKIT BA? Ang operasyon ay sa ilalim ng general o spinal anesthesia, kaya wala kayong mararamdaman. Pagkatapos, masakit, namamaga, at may pasa ang ari at bayag sa loob ng ilang linggo — nakakatulong ang scrotal support, yelo, at pain medicine. Tumatagal ito ng isang oras; marami ang nakakauwi sa araw din.

Paano Maghanda (Bago ang Operasyon)

- Isinasagawa sa ilalim ng **general o spinal anesthesia** — sundin ang lahat ng tagubilin (pag-aayuno, at kung aling gamot ang ihihint, kasama ang blood thinners).
- Kritikal ang pag-iwas sa impeksiyon:** ang anumang impeksiyon (kasama ang UTI) ay ginagamot muna, at maliligo kayo gamit ang antiseptic soap at bibigyan ng antibiotics.
- Huwag manigarilyo o mag-vape,** at kung mayroon kayong **diabetes**, gugustuhin ng inyong care team na kontrolado ang blood sugar — parehong nagpapababa ng panganib ng impeksiyon.

Sabihin sa inyong care team nang maaga kung kayo ay:

- May **diabetes**, o nahihirapan gamitin ang mga kamay (kayo mismo ang magpapagana ng pump)
- Nakaranas na ng pelvic o penile surgery, radiation, o nakaraang implant

Ano ang Nangyayari sa Operasyon

- Kayo ay natutulog o manhid mula sa baywang pababa sa ilalim ng anesthesia, at bibigyan ng antibiotics.
- Sa pamamagitan ng isang maliit na hiwa (malapit sa bayag o ibabang tiyan), inilalagay ng siruhano ang mga **cylinders** sa ari, ang **pump** sa bayag, at ang **reservoir** sa ibabang tiyan — lahat sa ilalim ng balat.
- Sinubukan ang device, pagkatapos ay iniwan na naka-deflate habang gumagaling. Maaaring mailagay ang catheter nang ilang sandali.

Pagkatapos ng Operasyon

- Magsuot ng scrotal support, gumamit ng yelo, uminom ng pain medicine, at panatilihin malinis at tuyo ang hiwa.
- Huwag gamitin ang device o makipagtalik hangga't hindi pinapayagan — karaniwang 4–6 linggo.** Sa **activation visit**, unang ini-inflate ang device at tinuturuan kayo sa pump.
- Pagkatapos, **i-inflate at i-deflate ito araw-araw ("cycling")** sa unang ilang buwan — pinapanatili nitong maayos ang pagtatrabaho nito.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginginig, o lumalaking pamumula, sakit, pamamaga, o pagtatae sa hiwa
- Hindi makaihi
- Matinding o lumalalang sakit, o ang ari ay mukhang maitim o mapulang-maitim

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

- Ang IPP ay isang nakatagong device para sa ED na hindi tumugon sa ibang paggamot — piguiin ang pump sa bayag para sa erection, pindutin ang release valve para maging malambot.
- Ito ay isang **permanenteng pagpipilian** (hindi na gagana ang natural na erection at gamot/iniksyon pagkatapos), ngunit **hindi nito binabago ang pag-ih, pakiramdam, orgasm, o ejaculation.**
- Ang pag-iwas sa impeksiyon ang pinakamahalaga — gamutin muna ang anumang impeksiyon, huwag manigarilyo, at gamitin ang antiseptic wash at antibiotics.