

Intermittent Self-Catheterization (ISC)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Pag-alisan ng ihi sa pantog gamit ang manipis na catheter

Ang intermittent self-catheterization (ISC) o malinis na pamamaraan ng sariling pag-catheter ay paraan ng pag-ubusan ng pantog sa pamamagitan ng mahinahong pagpasok ng manipis, malambot na catheter, pag-alisan ng ihi, at pagbunot nito — ilang beses sa isang araw. Ginagamit ito kapag hindi mabuti ang pag-alisan ng pantog sa sarili. Kapag natuto na, ilang minuto lamang ito, nagbibigay ng kalayaan, at nagpoprotekta sa inyong mga bato.

Bakit Ito Ginagawa

Kung hindi maubos ng pantog ang ihi — pagkatapos ng ilang operasyon, sa **neurogenic bladder** (pantog na may problema sa neryo), sa prolapse, o sa pagbara sa daanan ng ihi — ang natitirang ihi ay maaaring magdulot ng impeksiyon, pagtagas, at presyur na makakasama sa mga bato. Ang ISC ay **ganap na nag-uubos ng pantog** ayon sa iskedyul, at nireresolta ang mga problemang ito.

Bakit Mas Mabuti Kaysa Permanenteng Catheter

- **Mas kaunting impeksiyon** kumpara sa indwelling (nakalagay) na catheter
- **Walang bag** at mas malaking kalayaan — walang nakakabit sa pagitan ng mga catheterization
- Mas mahusay na pangmatagalang proteksyon para sa pantog at mga bato

Maaaring mahirap sa simula, ngunit karamihan sa mga tao — at sa mga tagapag-alaga — natututo ito nang mabilis sa tulong ng nars.

MGA TERMINO

ISC

Intermittent self-catheterization (CIC) — pag-uubos ng pantog sa sarili, tapos pagbunot ng catheter.

Catheter

Manipis, malambot na tubo na ipinasok sa pantog para alisan ng ihi.

Post-void residual

Ang ihig nananatili sa pantog pagkatapos umihi.

Neurogenic bladder

Pantog na hindi gumagana nang normal dahil sa problema sa neryo.

Malinis na pamamaraan

Paghuhugas ng kamay at lugar — malinis, hindi ganap na sterile.

Indwelling catheter

Catheter na nakalagay nang matagal na may bag (ito ang iniwasan ng ISC).

MASAKIT BA? Kadalasan hindi — karamihan ay nakakaramdam lamang ng banayad na presyur, at ang mga modernong catheter ay may pre-lubrication at napakanipi. Maaaring may kaunting diskomfort o kaunting dugo sa unang ilang beses. Ituturo ng nars ang bawat hakbang hanggang sa maging komportable kayo.

Paano Ito Isinasagawa (Malinis na Pamamaraan)

- 1 **Hugasan ang mga kamay** at ihanda ang mga kagamitan; linisin ang bukana.
- 2 **Maingat na ipasok** ang lubricated na catheter hanggang lumabas ang ihi; ituloy pa nang kaunti.
- 3 Hayaang **maubos ang pantog**, pagkatapos ay dahan-dahang bunuting muli ang catheter.
- 4 **Itapon** ang single-use na catheter (o linisin ang reusable ayon sa tagubilin) at hugasan ang kamay.

Gaano Kadalas

- Kadalasan **bawat 4–6 na oras** (mga 4–6 beses sa isang araw) — ang inyong care team ang magtatakda ng iskedyul.
- Huwag laktawan — ang regular na iskedyul ay pumipigil sa pagpuno ng sobra at sa impeksiyon.
- Uminom nang normal; itala ang dami ng ihi kung hihilingin.

Dapat Malaman

- Maaaring gawin sa anumang malinis na banyo; ang mga kagamitan ay madaling dalhin.
- Ang kaunting ulap o bakterya sa ihi ay karaniwan — ang UTI ay ginagamot lamang kapag may **sintomas**.
- Maaaring turuan ang isang tagapag-alaga kung kayo ay hindi makagawa nito nang mag-isa.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi maipasok ang catheter**, o kaunti/walang ihi ngunit pakiramdam ay puno
- Lagnat, panginig, o sakit sa likod/tagiliran (posibleng impeksiyon)
- Tuloy-tuloy na **pagdurugo** o matinding sakit

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang ISC ay nag-uubos ng pantog na hindi makaubusan sa sarili — pinoprotektahan ang mga bato at pinipigilan ang impeksiyon at pagtagas ng ihi.
2. Gumamit ng malinis na pamamaraan ayon sa regular na iskedyul (kadalasan bawat 4–6 na oras); ituturo ng nars hanggang maging madali.
3. Kadalasan ito ay hindi masakit at mas ligtas kaysa nakalagay na catheter. Tumawag kung hindi maipasok, hindi maubos ang pantog, o nagkalagnat.