

Заместительная терапия тестостероном (мужчины)

Информация для пациента · Лечение подтверждённого дефицита тестостерона с симптомами

WARWIKI

Заместительная терапия тестостероном (TRT) назначается мужчинам, у которых **одновременно** подтверждён низкий уровень тестостерона и есть соответствующие симптомы — снижение либидо, усталость, подавленное настроение, снижение мышечной массы или нарушения эрекции. TRT восстанавливает тестостерон до нормального диапазона с помощью геля, инъекций, пластыря или имплантируемых гранул. Это **не** средство «от старения» и не показано при нормальных уровнях.

Механизм действия и показания

Дефицит тестостерона (гипогонадизм) диагностируется по **двум утренним анализам крови** в сочетании с симптомами — одного низкого результата недостаточно. При наличии обоих критериев TRT может улучшить энергию, либидо, настроение и мышечную массу в течение недель или месяцев.

Формы выпуска

- **Гель или раствор** — наносится ежедневно (необходимо избегать контакта кожа к коже с женщинами и детьми).
- **Инъекции** — каждые 1–2 недели либо пролонгированная форма каждые ~10 недель.
- **Пластырь, имплантируемые гранулы** (каждые 3–6 месяцев) или назальный гель.

ТЕРМИНЫ

Тестостерон

Основной мужской гормон; влияет на либидо, энергию, настроение и мышцы.

Гипогонадизм

Подтверждённый дефицит тестостерона.

Гематокрит

Показатель крови, который TRT может повышать — контролируется.

PSA

Анализ крови на простату; проверяется до и во время лечения.

Фертильность

TRT снижает выработку сперматозоидов — важно, если вы планируете детей.

Перенос геля

Гель может попасть на других людей — закрывайте место нанесения, мойте руки.

ПЛАНИРУЕТЕ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ? Сообщите об этом своему врачу заранее. TRT **снижает выработку сперматозоидов и может вызвать бесплодие** — иногда стойкое. Если фертильность важна для вас, существуют другие методы лечения, повышающие тестостерон без ущерба для сперматогенеза. Не начинайте TRT, не обсудив это с врачом.

Мониторинг (важно)

TRT требует регулярных визитов и анализов крови:

- **Уровень тестостерона** — для подтверждения нахождения в норме.
- **Гематокрит** — TRT может сгущать кровь; при превышении нормы доза корректируется или делается пауза.
- **PSA / простата** — проверяется до и во время лечения; TRT не назначается при нелечённом раке простаты.

Безопасное применение

- **Гель:** наносите по инструкции, дайте высохнуть, закройте область и вымойте руки — избегайте переноса на женщин и детей.
- Не меняйте дозу самостоятельно; соблюдайте все назначенные анализы.
- Сообщите врачу о болезнях сердца или **апноэ сна** (TRT может их усугубить).

Частые побочные эффекты

- Акне, жирность кожи, задержка жидкости
- Болезненность молочных желёз; уменьшение яичек; снижение фертильности
- Повышение числа красных кровяных клеток (может потребоваться контроль или кровопускание)

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Боль в груди, отёк или боль в ноге, затруднённое дыхание
- Сильные головные боли, нарушения зрения или симптомы «густой крови»
- Новые нарушения мочеиспускания или проблемы с простатой

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. TRT предназначена для мужчин с **подтверждённым дефицитом тестостерона и симптомами** — не при нормальных уровнях и не как средство от старения.
2. Терапия **снижает фертильность** — сообщите врачу до начала лечения, если планируете детей.
3. Необходим регулярный контроль (тестостерон, клинический анализ крови, простата). При использовании геля избегайте его переноса на других.