

Уретральное объёмообразование

WARWIKI

Информация для пациента · Офисная инъекция при стрессовом недержании мочи

Уретральное объёмообразование — малоинвазивный метод лечения **стрессового недержания мочи (SUI)** — утечки мочи при кашле, смехе или физической нагрузке. Мягкий материал вводится вокруг уретры, помогая ей закрываться плотнее при повышении давления в животе. Процедура выполняется быстро, без разреза и может быть альтернативой или подготовительным шагом перед операцией слинга.

Как это действует

Объёмообразующий материал вводится в стенку уретры в нескольких точках, **увеличивая её объём** так, чтобы просвет закрывался полнее. При лучшем смыкании уретры резкое повышение давления в животе реже приводит к утечке мочи.

Подходит ли это вам?

- Хороший вариант, если вы хотите **быстрое, малорисковое** лечение без операции
- Подходит тем, кому слинг противопоказан или нежелателен
- Может служить **промежуточным решением** перед окончательным выбором операции

Эффект, как правило, **менее продолжителен**, чем у слинга, и полностью устранить недержание удаётся не всегда, однако процедуру можно **повторить** при снижении результата.

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание

Утечка мочи при давлении — кашле, смехе, подъёме тяжестей, нагрузке.

Объёмообразующий агент

Мягкий материал, вводимый для утолщения стенки уретры.

Уретра

Трубка, по которой моча выводится из организма.

Цистоскоп

Тонкая камера, используемая для контроля инъекции.

Слинг

Хирургическая опора под уретрой — более долгосрочная альтернатива.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Процедура обычно выполняется **амбулаторно с местным обезболиванием** и занимает около 10–15 минут. Большинство пациентов ощущают лишь лёгкое давление и уходят домой в тот же день, быстро возвращаясь к привычной активности. Кратковременное жжение после процедуры — норма.

Как подготовиться

- **Анализ мочи** для исключения инфекции перед процедурой
- Сообщите врачу о **приёме разжижающих кровь препаратов** и аллергиях
- Особой подготовки не требуется — обычно можно приехать и уехать самостоятельно

Что происходит

- 1 Наносится обезболивающее средство.
- 2 В уретру вводится тонкий **цистоскоп** для осмотра.
- 3 Объёмобразующий материал вводится в нескольких точках вокруг уретры.
- 4 Инструмент извлекается; перед уходом вы опорожняете мочевой пузырь.

После

- Лёгкое жжение, позывы или незначительная кровь в моче в течение одного-двух дней — это нормально.
- Сразу после процедуры возможны **временные затруднения мочеиспускания** — как правило, кратковременные.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Нет мочеиспускания** после процедуры
- Повышение температуры или озноб (возможная инфекция)
- Сильное кровотечение или нарастающая боль

Полезно знать

- Полный эффект проявляется в течение нескольких недель.
- Если со временем недержание возвращается, инъекцию можно **повторить**.
- Слинг остаётся вариантом в будущем, если вы хотите более стойкого результата.

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Уретральное объёмобразование — быстрая инъекция без разреза, которая помогает уретре закрываться плотнее и уменьшает стрессовое недержание.
2. Эффект менее стойкий, чем у слинга, и может не устранить недержание полностью, однако процедура малорисковая и повторяемая.
3. Восстановление быстрое. Обратитесь к врачу, если не можете помочиться или появилась температура.