

من أكثر الخطوات الأولى فاعلية للسيطرة على المثانة خياران لا يستلزمان دواءً ولا جراحة: تمارين عضلات قاع الحوض (المعروفة بتمارين كيجل) تقوّي العضلات التي تحبس البول، وتدريب المثانة يُعيد تأهيلها لتحتمل فترات أطول. مع الممارسة المنتظمة تُخفّف تسرّب البول الإجهادي وإلحاحه وكثرته — وهي مجانية وآمنة.

كيف تُسهم في التحسّن

- تمارين قاع الحوض تبني الدعمة العضلية أسفل المثانة والإحليل، فيقلّ التسرّب عند السعال أو رفع الأثقال أو ممارسة الرياضة، وتُساعد أيضًا على كبح إلحاح التبوّل.
- تدريب المثانة يمدّد تدريجيًا الفترات بين الزيارات للحمام، مما يهدّئ فرط نشاط المثانة (OAB) ويقلّل كثرة التبوّل.

تحديد العضلات الصحيحة

عضلات قاع الحوض هي التي تستخدمها لإيقاف تدفق البول أو حبس الغازات. اضغطها وارفعها للأعلى دون شدّ البطن أو الأرداف أو الفخذين، ودون حبس النفس. (لا تتدرّب بإيقاف البول فعليًا — هذا فقط لتحديد مكان العضلات.) إذا تعذّر عليك تحديدها، يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي لقاع الحوض المساعدة، وأحيانًا بالتغذية الراجعة.

تعلم المصطلحات

قاع الحوض

حزمة العضلات الداعمة للمثانة والأمعاء والرحم (لدى النساء).

كيجل

تمارين الضغط والرفع لعضلات قاع الحوض.

تدريب المثانة

مدّ الفترات بين زيارات الحمام تدريجيًا.

كبح الإلحاح

تهدئة الرغبة المفاجئة في التبوّل للوصول إلى المرحاض دون تسرّب.

التغذية الراجعة

أداة تُظهر لك استخدام العضلات الصحيحة.

PT لقاع الحوض

معالج متخصص في هذه العضلات.

متى تظهر النتائج؟ تحلى بالصبر — يلاحظ معظم الأشخاص تحسناً بعد نحو 6-12 أسبوعاً من الممارسة المنتظمة، ويستمر التحسن مع الانتظام. كأي تمرين، تتراجع الفائدة عند التوقف، لذا الهدف هو جعله عادة يومية دائمة.

روتين يومي بسيط

مفيد أن تعرف

- يمكنك أداء هذه التمارين في أي مكان — لن يلاحظها أحد.
- الانتظام أهم من الشدة؛ اربطها بإشارات يومية (الوجبات، إشارات المرور).
- إذا كنت تعاني ألماً بالحوض أو توترًا عضليًا شديدًا، فقد يكون الهدف هو الإرخاء لا التقوية — استشر فريقك الطبي.

اتصل بفريقك الطبي إذا:

- لم تستطع تحديد العضلات الصحيحة
- تسببت التمارين في تفاقم الألم أو الضغط
- لم تلاحظ أي تحسن بعد أشهر عدة

ثلاثة أمور تذكرها

1. تمارين قاع الحوض وتدريب المثانة خطوات أولى آمنة ومجانية ومثبتة لعلاج التسرب والإحاح وكثرة التبول.
2. اضغط العضلات الصحيحة دون حبس النفس، وارخها تمامًا بين الضغوط، وأعد تدريب المثانة على الانتظار أطول.
3. أعطها 6-12 أسبوعاً وواظب. إن تفاقم الألم أو تعذر تحديد العضلات، اسأل عن العلاج الطبيعي لقاع الحوض.

1. اضغط عضلات قاع الحوض وأمسك 3-5 ثوانٍ، ثم ارخها تمامًا للمدة ذاتها.
2. كرر نحو 10 مرات، وأدّ 3 جلسات يوميًا. زد مدة الإمساك تدريجيًا كلما ازدادت قوتك.
3. أضف بضع ضغوط سريعة قوية تستخدمها قبيل السعال أو العطاس أو رفع الأثقال ("الحيلة").
4. الإرخاء الكامل بين الضغوط لا يقل أهمية عن الضغط ذاته.

تدريب المثانة

- احتفظ بيوميّات مثانة قصيرة لرصد نمطك.
- عند الإحساس بالإحاح: توقّف، اضغط قاع الحوض، تنفّس، ودّع الإحاح يمر — ثم امشِ بهدوء إلى المراض.
- مدد الفترات بين الزيارات بخطوات 15 دقيقة نحو فترة 3-4 ساعات.