

يحدث هبوط أعضاء الحوض عندما يضعف الدعم المحيط بها — المثانة أو الرحم أو المستقيم — فتضغط عضو أو أكثر داخل المهبل أو خارجه. يُسبب ذلك انتفاخاً أو إحساساً بالضغط. وهو شائع جداً، ليس خطيراً ولا سرطانياً، وتتوفر خيارات علاجية جيدة تتراوح بين التمارين وجهاز الدعم والجراحة.

### عن هذه الحالة

يُسمى الهبوط بحسب الجدار الذي ينزل:

- الجدار الأمامي (المثانة) — القيلة المثانية
- الجدار الخلفي (المستقيم) — القيلة المستقيمة
- القمة (الرحم، أو قمة المهبل بعد استئصال الرحم)

الأعراض الشائعة:

- انتفاخ أو كتلة تراها أو تشعر بها عند فتحة المهبل
- ضغط أو ثقل في الحوض، يشد في نهاية اليوم أو عند رفع الأشياء
- صعوبة في إفراغ المثانة أو الأمعاء بالكامل؛ وأحياناً الضغط على الانتفاخ للمساعدة على التبول أو التغوط ("الدعم اليدوي")

### الأسباب

أي عامل يُجهد الدعم الحوضي أو يُضعفه: الحمل والولادة، وسن اليأس والشيخوخة، والإجهاد المزمن (الإمساك أو السعال)، ورفع الأثقال، والجراحة الحوضية السابقة، والوزن الزائد، والاستعداد الوراثي.

### تعلم المصطلحات

#### هبوط الأعضاء

نزول عضو حوضي من موضعه الطبيعي.

#### القيلة المثانية

انتفاخ المثانة نحو الجدار الأمامي للمهبل.

#### القيلة المستقيمة

انتفاخ المستقيم نحو الجدار الخلفي للمهبل.

#### قبة المهبل

قمة المهبل التي قد تنزل بعد استئصال الرحم.

#### الفرزجة (pessary)

دعامة قابلة للإزالة تُوضع في المهبل لرفع الأعضاء.

#### الدعم اليدوي

الضغط على الانتفاخ لمساعدة إفراغ المثانة أو الأمعاء.

#### قاع الحوض

العضلات التي تدعم أعضاء الحوض.

#### POP-Q

الفحص المستخدم لقياس مدى الهبوط.

**هل يجب أن أعالجه؟** فقط إذا كان يُزعجك. الهبوط ليس خطيراً، فإن كانت الأعراض خفيفة يمكنك المراقبة فحسب. حين يؤثر على راحتك أو حياتك اليومية، تختار من بين خيارات فعّالة عدة — لا توجد إجابة "صحيحة" واحدة، ويمكنك تغيير رأيك مع الوقت.

### كيف تُشخّص

- فحص الحوض، غالباً أثناء الوقوف أو الإجهاد، لرؤية أيّ الجدران تنزل وإلى أي مدى
- مراجعة أعراض المثانة والأمعاء
- أحياناً فحص وظيفة المثانة إن كنت تعاني من تسرب البول أيضاً

### كيف تُعالج (خطوة بخطوة)

- 1 المراقبة فقط إن لم تكن الحالة مُزعجة، مع الوقاية (علاج الإمساك، وتجنب رفع الأثقال، والتحكم في الوزن).
- 2 تمارين قاع الحوض والعلاج الطبيعي للهبوط الخفيف.
- 3 الفرزجة (pessary) — دعامة قابلة للإزالة تُخفف الانتفاخ دون جراحة.
- 4 الجراحة — ترميم لاستعادة الدعم، أو إغلاق المهبل، أو التعليق. لكل منها نشرة خاصة.

### التعايش مع الهبوط

- حافظي على ليونة البراز وتجنّبي الإجهاد؛ ولا ترفعي ما يفوق ما أوصى به فريقك الطبي.
- مارسي تمارين قاع الحوض؛ وعالجي السعال المزمن وتحكمي في الوزن.
- يمكن أن تكون الفرزجة حلاً طويل الأمد، لا مجرد إجراء مؤقت.

#### اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- عدم القدرة على التبول أو التغوط
- أصبح الانتفاخ مؤلماً أو ينزف أو متقرحاً
- حمى، أو عدم القدرة على إدخال الانتفاخ للداخل

#### ثلاثة أمور تُذكّرنا

1. هبوط أعضاء الحوض شائع وغير خطير، ويُسبب انتفاخاً أو ضغطاً في منطقة الحوض.
2. عالجه فقط إن كان يُزعجك — الخيارات تتراوح بين المراقبة والتمارين والفرزجة والجراحة.
3. تجنّبي الإجهاد ورفع الأثقال. واطلبي الرعاية إن تعرّض إفراغ المثانة أو الأمعاء أو أصبح الانتفاخ مؤلماً أو متقرحاً.