

أثناء الولادة المهبلية، قد تتمزق المنطقة بين المهبل والشرج (العجان). يمتد التمزق من الدرجة الثالثة إلى عضلة العضلة العاصرة الشرجية، بينما يخترق التمزق من الدرجة الرابعة العضلة ليصل إلى بطانة المستقيم. تُعرف هذه التمزقات معاً بـ **OASIS**. تُصلح مباشرة بعد الولادة، وتتعافى معظم النساء تعافياً جيداً مع الرعاية الصحيحة.

ما الذي حدث

العضلة العاصرة الشرجية هي الحلقة العضلية التي تتحكم في خروج الغاز والبراز. يؤثر التمزق الشديد على هذه العضلة، لذا يكتسب الإصلاح الدقيق والمتابعة أهمية بالغة لحماية التحكم المعوي على المدى البعيد. هذه التمزقات ليست بسبب شيء فعلته.

الإصلاح الجراحي

يُجرى الإصلاح عقب الولادة مباشرة، في غرفة العمليات أو غرفة الولادة، تحت تخدير مناسب (في الغالب تخدير شوكي أو فوق الجافية). يُعيد الجراح بناء الأنسجة **طبقةً بعد طبقة** — بما يشمل إعادة توصيل عضلة العاصرة، وفي الدرجة الرابعة بطانة المستقيم — بغرز قابلة للامتصاص. ستحصلين على مضادات حيوية وخطة لتسكين الألم ورعاية الأمعاء.

تعلم المصطلحات

العجان

المنطقة بين المهبل والشرج.

OASIS

إصابة العضلة العاصرة الشرجية أثناء الولادة — تمزق 3rd أو 4th درجة.

العضلة العاصرة الشرجية

الحلقة العضلية التي تتحكم في خروج الغاز والبراز.

الدرجة الثالثة

تمزق يمتد إلى عضلة العاصرة الشرجية.

الدرجة الرابعة

تمزق يخترق العاصرة ليصل إلى بطانة المستقيم.

ملتين البراز

دواء يُبقي البراز طرياً لتجنب الإجهاد خلال فترة الشفاء.

علاج طبيعي لقاع الحوض

علاج لاستعادة القوة والتنسيق بعد الشفاء.

هل ستعاني من مشكلات دائمة؟ تتعافى معظم النساء جيداً وتستعدن تحكماً طبيعياً. قد تلاحظ أقلية صعوبة في حبس الغاز أو البراز، لذا تبقى المتابعة وعلاج قاع الحوض مهمين — وتتوفر علاجات فعالة إذا استمرت الأعراض. أخبري فريقك الطبي عن أي تسرب بدلاً من الانتظار.

الشفاء والعناية الذاتية

- 1 أبقى البراز طرياً — تناولي ملين البراز الموصوف لك، واشربي السوائل وتناولي الألياف لتجنب الإجهاد.
- 2 تسكين الألم والنظافة — استخدمى المسكنات الموصوفة، واشطفي المنطقة بماء دافئ بعد دخول الحمام وأبقِها نظيفة وجافة.
- 3 الراحة والتعافي التدريجي — تجنبي رفع الأثقال فوق ما يتطلبه حمل طفلك؛ تحسّن تدريجي متوقع خلال أسابيع.
- 4 العلاج الطبيعي لقاع الحوض — يساعد على استعادة القوة بعد بدء التعافي الأولي.

المتابعة والولادات القادمة

- ستخضعين لفحص لتقييم الإصلاح والتحكم المعوي.
- ناقشي الولادات المستقبلية — سيرشدك فريقك إلى أسلم طريقة للولادة في المرة القادمة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى، أو ألم متزايد، أو إفرازات ذات رائحة كريهة (عدوى محتملة)
- بدا أن الجرح يفتتح
- تسرب غاز أو براز، أو صعوبة جديدة في التحكم
- إمساك شديد أو تعدد التبرز

معلومات مفيدة

- اجلسي بارتياح (قد تساعد وسادة) واستخدمى الثلج مبكراً للتورم.
- لا تضعي أي شيء في المستقيم (لا تحاميل ولا حقن شرجية) ما لم يوص بذلك فريقك الطبي.

ثلاثة أمور تذكرها

1. تمزق 3rd أو 4th درجة (OASIS) يطل العضلة العاصرة الشرجية ويُصلح بالطبقات مباشرة بعد الولادة.
2. أبقى البراز طرياً، وارعي الجرح، وأجري علاج قاع الحوض — تتعافى معظم النساء تعافياً جيداً.
3. أبلغني عن أي تسرب للغاز أو البراز، أو حمّى، أو تفتح الجرح — التدخل المبكر يُحسن النتائج.