

تُنشئ فتحة الإحليل العجانية فتحةً دائمةً جديدةً للبول في العجان — المنطقة الواقعة بين كيس الصفن والشرج. تُستخدم حين يكون الإحليل (مجرى البول) ضيقاً أو متندباً أو تالفاً بما يحول دون إصلاحه. بعد العملية تتبَوَّل جالساً عبر هذه الفتحة بدلاً من رأس القضيب. يشرح هذا المنشور آلية العمل والتحضير وما يمكن توقُّعه.

عن هذا الإجراء

التضيِّق هو قطعة متندبة ضيقة من الإحليل (مجرى البول) تعيق تدفق البول. حين يكون التضيِّق طويلاً أو يتكرَّر بعد الإصلاح أو يكون الإحليل تالفاً تلفاً شديداً، يأخذ الجراح الجزء السليم من الإحليل (خلف التضيِّق) ويصله بجلد العجان ويخيطه مفتوحاً لتكوين فتحة دائمة، فيخرج البول منها. هذا حلٌّ موثوق ودائم يتفادى إعادة البناء المطولة أو المتكرِّرة — خيارٌ جيّد للتضيِّقات المعقَّدة أو لمن يفضل تجنُّب عمليات متعدِّدة.

ما تحتاج معرفته

التغيير الرئيسي هو أنك ستتبَوَّل جالساً عبر الفتحة الجديدة؛ لن يخرج البول بعد ذلك من رأس القضيب. يتكيَّف معظم الرجال جيِّداً ويكونون راضين. يبقى القضيب في مكانه — يظل الإحساس والنشوة دون تغيير في الغالب، ويحتفظ معظم الرجال بانتصابهم (قد يلاحظ بعضهم تغييراً). قد تضيِّق الفتحة بمرور الوقت؛ وإن حدث ذلك يمكن عادةً فتحها بإجراء بسيط.

تعلم المصطلحات

الإحليل

الأنبوب الذي يحمل البول إلى خارج الجسم.

التضيِّق

قطعة متندبة ضيقة من الإحليل تعيق تدفق البول.

العجان

المنطقة بين كيس الصفن والشرج، حيث تُنشأ الفتحة الجديدة.

فتحة الإحليل العجانية

العملية التي تصل الإحليل بفتحة دائمة جديدة في العجان.

الفتحة (Stoma)

المنفذ الجديد الذي يخرج منه البول.

ضيق الفتحة

ضيق الفتحة الجديدة بمرور الوقت — يمكن إصلاحه عادةً بإجراء بسيط.

القسطرة

أنبوب لين يُترك في مكانه أسبوعاً أو أسبوعين ريثما تلتئم الفتحة.

التخدير العام

دواء يُقيِّك نائماً خالياً من الألم أثناء الجراحة.

هل سيولم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام أو النخاعي فلا تشعر بشيء خلالها. بعدها تَوَقَّع تورُّماً وكدمات وألماً في العجان لمدة 1-2 أسبوع — تُساعد الجلسات الدافئة (حمامات السيتر) والتلج ومسكنات الألم. تُوضع قسطرة أثناء العملية. يعود كثيرٌ من المرضى إلى المنزل في اليوم ذاته أو بعد ليلة واحدة.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

بعد الجراحة

- تَوَقَّع تورُّماً وكدمات وألماً في العجان لمدة 1-2 أسبوع. تُساعد الجلسات الدافئة والتلج ومسكنات الألم؛ احرص على نظافة المنطقة.
- تبقى القسطرة نحو 1-2 أسبوع ثم يُزِيلها الفريق الطبي. بعد ذلك سَتَبْذُل جالساً عبر الفتحة الجديدة.
- تجنّب رفع الأثقال والجهد وركوب الدراجة والجنس لعدة أسابيع، وتجنّب الجلوس مباشرةً على المنطقة حسب تعليمات الفريق.
- إن ضعف شعاع البول بمرور الوقت، قد تكون الفتحة تضيق — أخبر فريقك، إذ يمكن إعادة فتحها بإجراء بسيط.

- تُجرى تحت التخدير العام أو النخاعي — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وأي أدوية يجب إيقافها بما فيها مضادات التخثر).
- يُجرى تحليل بول للكشف عن العدوى (تُعالج أولاً)؛ ستحصل على مضادات حيوية. لا تدخّن — يُبطئ التئام الجروح.
- ستُرفع ساقاك في حوامل خلال العملية. استعدّ لقسطرة مدّتها نحو 1-2 أسبوع ورتّب وسيلة توصيل للمنزل.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- تألّقت إشعاعاً حوضياً — يزيد احتمال ضيق الفتحة
- تتناول مضاداً للتخثر، أو لديك عدوى حالية

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- سقطت القسطرة أو توقّفت عن الصرف، أو تعرّض عليك التبوّل بعد إزالتها
- حمّى أو قشعريرة، أو ازداد احمرار أو ألم أو تورّم أو إفراز في مكان الجرح
- نزيف غزير

- 1 أنت نائم أو مخدّر مع رفع الساقين في حوامل؛ تُعطى مضادات حيوية.
- 2 عبر شقّ في العجان، يعثر الجراح على الإحليل السليم خلف التضيق ويُزيل الجزء المتندّب أو يتجاوزّه.
- 3 يُوصل الإحليل السليم بالجلد ويُخاط مفتوحاً لتكوين فتحة واسعة جديدة؛ تُوضع قسطرة ويُغلّق الجرح.

ثلاثة أمور تذكّرها

1. تُنشئ فتحة الإحليل العجانية فتحة دائمة جديدة للبول في العجان — تُستخدم حين يكون الإحليل ضيقاً أو تالفاً. بعدها سَتَبْذُل جالساً.
2. الحلّ دائم وموثوق ويتفادى جراحات مطوّلة أو متكرّرة. يبقى القضيب في مكانه؛ يظلّ الإحساس والنشوة دون تغيّر في الغالب ويحتفظ معظم الرجال بانتصابهم.
3. تَوَقَّع قسطرة لمدة ~1-2 أسبوع. قد تضيق الفتحة بمرور الوقت — أخبر فريقك إن ضعف الشعاع. اتصل فوراً عند الحمّى أو النزيف الغزير أو صعوبة التبوّل.