

Beta-3 Agonists (अति सक्रिय मूत्राशय के लिए)

WARWIKI

रोगी जानकारी · कम dry-mouth वाली नई मूत्राशय की दवा

Beta-3 agonists, अति सक्रिय मूत्राशय (OAB) — पेशाब की तीव्र इच्छा, बार-बार पेशाब, और तीव्र इच्छा असंयम — के लिए एक नई श्रेणी की दवाएँ हैं। ये मूत्राशय को शिथिल करती हैं ताकि वह अधिक मूत्र रोक सके, और पुरानी anticholinergic दवाओं की तुलना में dry mouth, कब्ज और याददाश्त के दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। इस श्रेणी में दो दवाएँ हैं: mirabegron (Myrbetriq) और vibegron (Gemtesa)।

यह कैसे काम करती है

ये दवाएँ मूत्राशय की दीवार में beta-3 receptors को सक्रिय करती हैं, जिससे भरने के दौरान मूत्राशय की मांसपेशी शिथिल होती है। शांत मूत्राशय से अचानक तीव्र इच्छाएँ और बार-बार जाने की ज़रूरत कम होती है — यह anticholinergics से अलग रास्ते से काम करती है।

क्या उम्मीद करें

- फ़ायदा कुछ हफ़्तों में दिखता है; दिन में एक बार ली जाती है।
- आमतौर पर अच्छी तरह सहन होती है — dry mouth बहुत कम या नहीं।
- बुजुर्गों या जिन्हें anticholinergics से dry mouth या दूसरे दुष्प्रभाव हुए, उनके लिए अच्छा विकल्प।
- कभी-कभी anticholinergic के साथ मिलाकर भी दी जा सकती है।

शब्दों को समझें

अति सक्रिय मूत्राशय (OAB)

मूत्राशय के जल्दी सिकुड़ने से पेशाब की तीव्र इच्छा और बार-बार पेशाब।

Beta-3 agonist

Beta-3 receptors के ज़रिए मूत्राशय शिथिल करने वाली दवा।

Mirabegron / vibegron

इस श्रेणी की दो दवाएँ।

Anticholinergic

OAB की पुरानी दवाओं की श्रेणी; beta-3 agonists उनके कई दुष्प्रभाव नहीं करती।

Blood pressure

Mirabegron इसे थोड़ा बढ़ा सकती है — इसकी निगरानी होती है।

पुरानी दवाओं की जगह यह क्यों लें? OAB में beta-3 agonists anticholinergics जितना ही असर करती हैं, लेकिन **dry mouth और कब्ज बहुत कम** होती है, और याददाश्त की चिंता भी नहीं — इसीलिए, खासकर बुजुर्गों के लिए, इन्हें अक्सर पहले पसंद किया जाता है। मुख्य ध्यान blood pressure पर रखना होता है।

कैसे लें

- निर्देशानुसार **दिन में एक बार** लें; असर दिखने में कुछ हफ्ते दें।
- बेहतर नतीजे के लिए मूत्राशय प्रशिक्षण और पेल्विक फ्लोर व्यायाम (केगेल) भी करें।
- follow-up जारी रखें ताकि टीम असर और blood pressure जाँच सके।

ज़रूरी सुरक्षा

- Mirabegron blood pressure बढ़ा सकती है** — इसकी निगरानी होती है; बहुत अधिक या अनियंत्रित blood pressure में इसे नहीं दिया जाता। (Vibegron का blood pressure पर बहुत कम असर होता है।)
- अपनी दूसरी दवाओं की जानकारी टीम को दें — mirabegron कुछ दवाओं के स्तर को प्रभावित कर सकती है।
- किसी भी OAB उपचार की तरह, पेशाब करने में दिक्कत हो तो बताएँ।

सामान्य दुष्प्रभाव

- आमतौर पर हल्के — सिरदर्द, नाक बंद होना
- Blood pressure में वृद्धि (मुख्यतः mirabegron)
- मूत्र मार्ग संक्रमण (UTI), या हल्की कब्ज

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बहुत अधिक blood pressure**, या तेज़ सिरदर्द
- पेशाब नहीं हो रहा** या मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं लगता
- चेहरे, होंठ, या जीभ में सूजन, या साँस लेने में कठिनाई (दुर्लभ एलर्जी) — तुरंत आपातकालीन देखभाल लें

याद रखने योग्य तीन बातें

- Beta-3 agonists मूत्राशय को शिथिल कर OAB के लक्षण कम करती हैं, पुरानी दवाओं से **बहुत कम dry mouth** के साथ।
- बुजुर्गों या anticholinergic दुष्प्रभाव के बाद यह अक्सर बेहतर विकल्प है; कुछ हफ्ते दें।
- Mirabegron blood pressure बढ़ा सकती है — check-up जारी रखें। पेशाब न हो या blood pressure अचानक बढ़े तो तुरंत बुलाएँ।